

# 奈良県立医科大学附属病院 登録レジメン一覧

2023年12月26日 現在

| レジメン名                           | 1コースの日数 | 予定コース数                 | 使用抗がん薬  | 投与量                    | 投与方法 | 投与日                            |
|---------------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|------|--------------------------------|
| <b>【頭頸部】</b>                    |         |                        |         |                        |      |                                |
| 【頭頸部】RT+triweeklyCDDP(アロカリスver) | 21日     | 3コース                   | シスプラチン  | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                              |
| 【頭頸部】RT+triweeklyCDDP           | 21日     | 3コース                   | シスプラチン  | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                              |
| 【頭頸部】RT+weeklyCDDP              | 7日      | 7コース                   | シスプラチン  | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                              |
| 【頭頸部】RT+weeklyCDDP(プロイメンD ver)  | 7日      | 7コース                   | シスプラチン  | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                              |
| 【頭頸部】CDDP+5-FU                  | 21日     |                        | シスプラチン  | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | 5-FU    | 800 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5                            |
| 【頭頸部】CDDP+5-FU (アロカリスVer)       | 21日     |                        | シスプラチン  | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | 5-FU    | 800 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5                            |
| 【頭頸部】DOC+CDDP+5-FU              | 21日     | 4コース                   | ドセタキセル  | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | シスプラチン  | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | 5-FU    | 700 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5                            |
| 【頭頸部】DOC+CDDP+5-FU(アロカリスver)    | 21日     | 4コース                   | ドセタキセル  | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | シスプラチン  | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | 5-FU    | 700 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5                            |
| 【頭頸部】RT+CBDCA                   | 7日      | 8コース                   | カルボプラチン | 1.5 AUC                | 点滴   | 1                              |
| 【頭頸部】DOC+CDDP                   | 21日     |                        | ドセタキセル  | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | シスプラチン  | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                              |
| 【頭頸部】CBDCA+5-FU(口腔外科)           | 14日     |                        | カルボプラチン | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-3                            |
|                                 |         |                        | 5-FU    | 500 mg/body            | 点滴   | 4-7                            |
| 【頭頸部】CBDCA+5-FU                 | 21日     | 6コース                   | カルボプラチン | 5 AUC                  | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | 5-FU    | 800 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5                            |
| 【頭頸部】DOC                        | 21日     |                        | ドセタキセル  | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                              |
| 【頭頸部】weeklyPTX                  | 49日     | PDまで                   | パクリタキセル | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15,22,29,36                |
| 【頭頸部】weeklyCmab±RT              | 7日      |                        | アービタックス | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1 初回                           |
|                                 |         |                        |         | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1 2回目以降                        |
| 【頭頸部】Cmab+CDDP+5-FU             | 21日     | 6コース                   | アービタックス | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15 初回：400mg/m <sup>2</sup> |
|                                 |         |                        | シスプラチン  | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | 5-FU    | 800 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5                            |
| 【頭頸部】Cmab+CBDCA+5-FU            | 21日     | 6コース→Cmab単剤            | アービタックス | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15 初回：400mg/m <sup>2</sup> |
|                                 |         |                        | カルボプラチン | 5 AUC                  | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | 5-FU    | 800 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5                            |
| 【頭頸部】Cmab+CBDCA+5-FU(アロカリスver)  | 21日     | 6コース→Cmab単剤            | アービタックス | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15 初回：400mg/m <sup>2</sup> |
|                                 |         |                        | カルボプラチン | 5 AUC                  | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | 5-FU    | 800 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5                            |
| 【頭頸部】Cmab+PTX                   | 7日      | PDまで                   | アービタックス | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1 初回：400mg/m <sup>2</sup>      |
|                                 |         |                        | パクリタキセル | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                              |
| 【頭頸部】Cmab+PTX+CBDCA             | 21日     | 6コース                   | アービタックス | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15 初回：400mg/m <sup>2</sup> |
|                                 |         |                        | パクリタキセル | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8                            |
|                                 |         |                        | カルボプラチン | 2.5 AUC                | 点滴   | 1,8                            |
| 【頭頸部】RADPLAT (GDDP)             | 7日      | 7コース                   | シスプラチン  | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 動注   | 1                              |
| 【頭頸部】Nivo                       | 日       | PDまで                   | オブジーボ   | 240 mg/body            | 点滴   | 1 q2w                          |
|                                 |         |                        |         | 480 mg/body            | 点滴   | 1 q4w                          |
| 【唾液腺】Tmab+PTX                   | 21日     | 7コース(8コース目からはハーセプチン単剤) | ハーセプチン  | 8 mg/kg                | 点滴   | 1 初回                           |
|                                 |         |                        |         | 6 mg/kg                | 点滴   | 1 2回目以降                        |
|                                 |         |                        | パクリタキセル | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1(1コース目はday2) 7コース目まで          |
| 【頭頸部】CBDCA+5-FU動注:セルジンガー法(口腔外科) | 7日      |                        | カルボプラチン | AUC                    | 動注   | 1 AUC:4~7                      |
|                                 |         |                        | 5-FU    | 500 mg/body            | 動注   | 2-5                            |
| 【唾液腺】Tmab+DOC                   | 21日     | PDまで                   | ハーセプチン  | 8 mg/kg                | 点滴   | 1 初回                           |
|                                 |         |                        |         | 6 mg/kg                | 点滴   | 1 2回目以降                        |
|                                 |         |                        | ドセタキセル  | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1 75歳以上は55mg/m <sup>2</sup>    |
| 【頭頸部】Pembro                     | 21日     | PDまで                   | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1 q3w                          |
|                                 |         |                        |         | 400 mg/body            | 点滴   | 1 q6w                          |
| 【頭頸部】Pembro+CDDP+5-FU           | 21日     | 6コース→Pembro単独          | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | シスプラチン  | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | 5-FU    | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1-4                            |
| 【頭頸部】Pembro+CDDP+5-FU(アロカリスver) | 21日     | 6コース→Pembro単独          | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | シスプラチン  | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                              |
|                                 |         |                        | 5-FU    | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1-4                            |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
 注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名                             | 1コースの日数 | 予定コース数              | 使用抗がん薬                     | 投与量   | 投与方法           | 投与日           |
|-----------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|---|----------------|---------------|
| 【頭頸部】Pembro+CBDCA+5-FU(アロカリス ver) | 21日     | 6コース→<br>Pembro単独   | キイトルーダ<br>カルボプラチン<br>5-FU  | 200 mg/body<br>5 AUC<br>1000 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1-4 |
| 【頭頸部】Pembro+CBDCA+5-FU            | 21日     | 6コース→<br>Pembro単独   | キイトルーダ<br>カルボプラチン<br>5-FU  | 200 mg/body<br>5 AUC<br>1000 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1-4 |
| 【頭頸部】アキシャルクス                      | 28日     | 最大4コース              | アキシャルクス                    | 640 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴             | 1             |
| <b>小細胞肺</b>                       |         |                     |                            |   |                |               |
| 【SCLC】CPT-11+CDDP                 | 28日     | 4コース                | イリノテカン<br>シスプラチン           | 60 mg/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup>                  | 点滴<br>点滴       | 1,8,15<br>1   |
| 【SCLC】CPT-11+CDDP(プロイメンド ver)     | 28日     | 4コース                | イリノテカン<br>シスプラチン           | 60 mg/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup>                  | 点滴<br>点滴       | 1,8,15<br>1   |
| 【SCLC】VP-16+CDDP(プロイメンド ver)      | 21日     | 4コース                | エトポシド<br>シスプラチン            | 100 mg/m <sup>2</sup><br>80 mg/m <sup>2</sup>                 | 点滴<br>点滴       | 1-3<br>1      |
| 【SCLC】VP-16+CDDP                  | 21日     | 4コース                | エトポシド<br>シスプラチン            | 100 mg/m <sup>2</sup><br>80 mg/m <sup>2</sup>                 | 点滴<br>点滴       | 1-3<br>1      |
| 【SCLC】CPT-11+CBDCA                | 28日     | 4コース                | イリノテカン<br>カルボプラチン          | 50 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC                                 | 点滴<br>点滴       | 1,8,15<br>1   |
| 【SCLC】VP-16+CBDCA                 | 21日     | 4コース                | エトポシド<br>カルボプラチン           | 80 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC                                 | 点滴<br>点滴       | 1-3<br>1      |
| 【SCLC】AMR                         | 21日     | PDまで                | カルセド                       | 40 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴             | 1-3           |
| 【SCLC】NGT                         | 21日     | PDまで                | ハイカムチン                     | 1 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴             | 1-5           |
| 【SCLC】CPT-11                      | 28日     | PDまで                | イリノテカン                     | 100 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴             | 1,8,15        |
| 【SCLC】Atezo+CBDCA+VP-16           | 21日     | 4コース→Atezo<br>維持療法  | テセントリク<br>カルボプラチン<br>エトポシド | 1200 mg/body<br>5 AUC<br>100 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1-3 |
| 【SCLC】Atezo                       | 21日     | PDまで                | テセントリク                     | 1200 mg/body  | 点滴             | 1             |
| 【SCLC】Durva+VP-16+CDDP            | 21日     | 4コース→Durva<br>維持療法へ | イミフィンジ<br>エトポシド<br>シスプラチン  | 1500 mg/body<br>100 mg/m <sup>2</sup><br>80 mg/m <sup>2</sup> | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1-3<br>1 |
| 【SCLC】Durva+VP-16+CBDCA           | 21日     | 4コース→Durva<br>維持療法へ | イミフィンジ<br>エトポシド<br>カルボプラチン | 1500 mg/body<br>100 mg/m <sup>2</sup><br>6 AUC                | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1-3<br>1 |
| 【SCLC】Durva                       | 28日     | PDまで                | イミフィンジ                     | 1500 mg/body  | 点滴             | 1             |

体重30kg以下の場合は20mg/kg

体重30kg以下の場合は20mg/kg

体重30kg以下の場合は20mg/kg

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名                                       | 1コースの日数 | 予定コース数     | 使用抗がん薬                       | 投与量   | 投与方法           | 投与日                                |
|---|---------|------------|------------------------------|---|----------------|------------------------------------|
| <b>非小細胞肺</b>                                |         |            |                              |   |                |                                    |
| 【NSCLC】PEM+CDDP                             | 21日     | 4コース       | アリムタ<br>シスプラチン               | 500 mg/m <sup>2</sup><br>75 mg/m <sup>2</sup>             | 点滴<br>点滴       | 1<br>1                             |
| 【NSCLC】PEM+CDDP(プロイメンド <sup>®</sup> ver)    | 21日     | 4コース       | アリムタ<br>シスプラチン               | 500 mg/m <sup>2</sup><br>75 mg/m <sup>2</sup>             | 点滴<br>点滴       | 1<br>1                             |
| 【NSCLC】DOC+CDDP                             | 21日     | 4コース       | ドセタキセル<br>シスプラチン             | 60 mg/m <sup>2</sup><br>80 mg/m <sup>2</sup>              | 点滴<br>点滴       | 1<br>1                             |
| 【NSCLC】VNR+CDDP(プロイメンド <sup>®</sup> ver)    | 21日     | 4コース       | ロゼウス<br>シスプラチン               | 25 mg/m <sup>2</sup><br>80 mg/m <sup>2</sup>              | 点滴<br>点滴       | 1,8<br>1                           |
| 【NSCLC】VNR+CDDP                             | 21日     | 4コース       | ロゼウス<br>シスプラチン               | 25 mg/m <sup>2</sup><br>80 mg/m <sup>2</sup>              | 点滴<br>点滴       | 1,8<br>1                           |
| 【NSCLC】CPT-11+CDDP(プロイメンド <sup>®</sup> ver) | 28日     | 4コース       | イリノテカン<br>シスプラチン             | 60 mg/m <sup>2</sup><br>80 mg/m <sup>2</sup>              | 点滴<br>点滴       | 1,8,15<br>1                        |
| 【NSCLC】CPT-11+CDDP                          | 28日     | 4コース       | イリノテカン<br>シスプラチン             | 60 mg/m <sup>2</sup><br>80 mg/m <sup>2</sup>              | 点滴<br>点滴       | 1,8,15<br>1                        |
| 【NSCLC】PEM+CDDP+BV                          | 21日     | 4コース       | アリムタ<br>シスプラチン<br>アバスタチン     | 500 mg/m <sup>2</sup><br>75 mg/m <sup>2</sup><br>15 mg/kg | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1                        |
| 【NSCLC】PEM+CDDP+BV(プロイメンド <sup>®</sup> ver) | 21日     | 4コース       | アリムタ<br>シスプラチン<br>アバスタチン     | 500 mg/m <sup>2</sup><br>75 mg/m <sup>2</sup><br>15 mg/kg | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1                        |
| 【NSCLC】PTX+CBDCA                            | 21日     | 6コース       | パクリタキセル<br>カルボプラチン           | 200 mg/m <sup>2</sup><br>6 AUC                            | 点滴<br>点滴       | 1<br>1                             |
| 【NSCLC】GEM+CBDCA                            | 21日     | 6コース       | ゲムシタビン<br>カルボプラチン            | 1000 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC                           | 点滴<br>点滴       | 1,8<br>1                           |
| 【NSCLC】S-1+CBDCA                            | 21日     | 6コース       | ティーエスワン<br>カルボプラチン           | 80 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC                             | 経口<br>点滴       | 1-14<br>1                          |
| 【NSCLC】nab-PTX+CBDCA                        | 21日     | 6コース       | アブラキサン<br>カルボプラチン            | 100 mg/m <sup>2</sup><br>6 AUC                            | 点滴<br>点滴       | 1,8,15<br>1                        |
| 【NSCLC】PEM+CBDCA                            | 21日     | 6コース       | アリムタ<br>カルボプラチン              | 500 mg/m <sup>2</sup><br>6 AUC                            | 点滴<br>点滴       | 1<br>1                             |
| 【NSCLC】weeklyPTX+CBDCA                      | 28日     | 6コース       | パクリタキセル<br>カルボプラチン           | 60 mg/m <sup>2</sup><br>6 AUC                             | 点滴<br>点滴       | 1,8,15<br>1                        |
| 【NSCLC】PTX+CBDCA+BV                         | 21日     | 4~6コース     | パクリタキセル<br>カルボプラチン<br>アバスタチン | 200 mg/m <sup>2</sup><br>6 AUC<br>15 mg/kg                | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1                        |
| 【NSCLC】PEM+CBDCA+BV                         | 21日     | 6コース       | アリムタ<br>カルボプラチン<br>アバスタチン    | 500 mg/m <sup>2</sup><br>6 AUC<br>15 mg/kg                | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1                        |
| 【NSCLC】BV                                   | 21日     | PDまで       | アバスタチン                       | 15 mg/kg  | 点滴             | 1                                  |
| 【NSCLC】PEM+BV                               | 21日     | PDまで       | アリムタ<br>アバスタチン               | 500 mg/m <sup>2</sup><br>15 mg/kg                         | 点滴<br>点滴       | 1<br>1                             |
| 【NSCLC】DOC                                  | 21日     | PDまで       | ドセタキセル                       | 60 mg/m <sup>2</sup>                                      | 点滴             | 1                                  |
| 【NSCLC】PEM                                  | 21日     | PDまで       | アリムタ                         | 500 mg/m <sup>2</sup>                                     | 点滴             | 1                                  |
| 【NSCLC】GEM                                  | 28日     | PDまで       | ゲムシタビン                       | 1000 mg/m <sup>2</sup>                                    | 点滴             | 1,8,15                             |
| 【NSCLC】VNR                                  | 21日     | PDまで       | ロゼウス                         | 25 mg/m <sup>2</sup>                                      | 点滴             | 1,8                                |
| 【NSCLC】AMR                                  | 21日     | PDまで       | カルセド                         | 40 mg/m <sup>2</sup>                                      | 点滴             | 1-3                                |
| 【NSCLC】CPT-11                               | 28日     | PDまで       | イリノテカン                       | 100 mg/m <sup>2</sup>                                     | 点滴             | 1,8,15                             |
| 【NSCLC】nab-PTX                              | 28日     | PDまで       | アブラキサン                       | 100 mg/m <sup>2</sup>                                     | 点滴             | 1,8,15                             |
| 【NSCLC】DOC+RAM                              | 21日     | PDまで       | サイラムザ<br>ドセタキセル              | 10 mg/kg<br>60 mg/m <sup>2</sup>                          | 点滴<br>点滴       | 1<br>1                             |
| 【NSCLC】Erlotinib+BV                         | 21日     | PDコース      | タルセバ<br>アバスタチン               | 150 mg/body<br>15 mg/kg                                   | 経口<br>点滴       | 1-21<br>1                          |
| 【NSCLC】RT+weeklyPTX+weeklyCBDCA             | 42日     | 1コース       | パクリタキセル<br>カルボプラチン           | 40 mg/m <sup>2</sup><br>2 AUC                             | 点滴<br>点滴       | 1,8,15,22,29,36<br>1,8,15,22,29,36 |
| 【NSCLC】RT+DOC+CDDP                          | 42日     | 1コース       | ドセタキセル<br>シスプラチン             | 40 mg/m <sup>2</sup><br>40 mg/m <sup>2</sup>              | 点滴<br>点滴       | 1,8,29,36<br>1,8,29,36             |
| 【NSCLC】RT+DOC+CDDP(プロイメンド <sup>®</sup> ver) | 42日     | 1コース       | ドセタキセル<br>シスプラチン             | 40 mg/m <sup>2</sup><br>40 mg/m <sup>2</sup>              | 点滴<br>点滴       | 1,8,29,36<br>1,8,29,36             |
| 【NSCLC】RT+weekly nab-PTX+CBDCA              | 42日     | 1コース→維持療法へ | アブラキサン<br>カルボプラチン            | 50 mg/m <sup>2</sup><br>2 AUC                             | 点滴<br>点滴       | 1,8,15,22,29,36<br>1,8,15,22,29,36 |
| 【NSCLC】Nivo                                 | 日       | PDまで       | オプジーボ                        | 240 mg/body<br>480 mg/body                                | 点滴<br>点滴       | 1<br>1                             |
|   |         |            |                              |   |                | q2w<br>q4w                         |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                           | 1コースの日数 | 予定コース数                  | 使用抗がん薬  | 投与量                    | 投与方法 | 投与日            |                      |
|---------------------------------|---------|-------------------------|---------|------------------------|------|----------------|----------------------|
| 【NSCLC】Pembro                   | 21日     | PDまで(化学療法併用時は計35回)      | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1              | q3w                  |
|                                 |         |                         |         | 400 mg/body            | 点滴   | 1              | q6w                  |
| 【NSCLC】Atezo                    | 21日     | PDまで、(術後補助療法)16回 or 1年間 | テセントリク  | 1200 mg/body           | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Durva                    | 28日     | 12か月まで                  | イミフィンジ  | 1500 mg/body           | 点滴   | 1              | 体重30kg以下は20mg/kg     |
| 【NSCLC】Atezo+BV+PTX+CBDCA       | 21日     | 4~6コース→維持療法へ            | テセントリク  | 1200 mg/body           | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アバスタチン  | 15 mg/kg               | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | パクリタキセル | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | カルボプラチン | 6 AUC                  | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Atezo+BV                 | 21日     | PDまで                    | テセントリク  | 1200 mg/body           | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アバスタチン  | 15 mg/kg               | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Pembro+nab-PTX+CBDCA     | 21日     | 4コース→Pembro維持療法         | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アブラキサン  | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15         |                      |
|                                 |         |                         | カルボプラチン | 6 AUC                  | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Pembro+PEM+CDDP          | 21日     | 4コース→Pembro+PEM維持療法へ    | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アリムタ    | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | シスプラチン  | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Pembro+PEM+CBDCA         | 21日     | 4コース→Pembro+PEM維持療法へ    | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アリムタ    | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | カルボプラチン | 5 AUC                  | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Pembro+PEM               | 21日     | PDまで                    | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アリムタ    | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Atezo+nab-PTX+CBDCA      | 21日     | 6コース→Atezo維持療法          | テセントリク  | 1200 mg/body           | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アブラキサン  | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15         |                      |
|                                 |         |                         | カルボプラチン | 6 AUC                  | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Atezo+PEM+CDDP           | 21日     | 6コース→Atezo+PEM維持療法へ     | テセントリク  | 1200 mg/body           | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アリムタ    | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | シスプラチン  | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Atezo+PEM+CBDCA          | 21日     | 6コース→Atezo+PEM維持療法へ     | テセントリク  | 1200 mg/body           | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アリムタ    | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | カルボプラチン | 6 AUC                  | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Atezo+PEM                | 21日     | PDまで                    | テセントリク  | 1200 mg/body           | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アリムタ    | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】gefitinib/erlotinib+RAM  | 14日     | PDまで                    | サイラムザ   | 10 mg/kg               | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | タルセバ    | 150 mg/body            | 経口   | 1-14           | (食事の1時間以上前又は食後2時間以降) |
|                                 |         |                         | 又はイレッサ  | 250 mg/body            | 経口   | 1-14           |                      |
| 【NSCLC】Nivo+Ipi (Ipi ≤ 120mg)   | 42日     | 最長24ヶ月間                 | オブジーボ   | 360 mg/body            | 点滴   | 1,22           |                      |
|                                 |         |                         | ヤーボイ    | 1 mg/kg                | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Nivo+Ipi+PEM+CDDP        | 42日     | 1コース→Nivo+Ipi維持へ        | オブジーボ   | 360 mg/body            | 点滴   | 1,22           |                      |
|                                 |         |                         | ヤーボイ    | 1 mg/kg                | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アリムタ    | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,22           |                      |
|                                 |         |                         | シスプラチン  | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,22           |                      |
| 【NSCLC】Nivo+Ipi+PEM+CBDCA       | 42日     | 1コース→Nivo+Ipi維持へ        | オブジーボ   | 360 mg/body            | 点滴   | 1,22           |                      |
|                                 |         |                         | ヤーボイ    | 1 mg/kg                | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アリムタ    | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,22           |                      |
|                                 |         |                         | カルボプラチン | 6 AUC                  | 点滴   | 1,22           |                      |
| 【NSCLC】Nivo+Ipi+PTX+CBDCA       | 42日     | 1コース→Nivo+Ipi維持へ        | オブジーボ   | 360 mg/body            | 点滴   | 1,22           |                      |
|                                 |         |                         | ヤーボイ    | 1 mg/kg                | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | パクリタキセル | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,22           |                      |
|                                 |         |                         | カルボプラチン | 6 AUC                  | 点滴   | 1,22           |                      |
| 【NSCLC】Nivo+Ipi維持 (Ipi ≤ 120mg) | 42日     | PDまで                    | オブジーボ   | 360 mg/body            | 点滴   | (q3w): 1,22    |                      |
|                                 |         |                         |         | 240 mg/body            | 点滴   | (q2w): 1,15,29 |                      |
|                                 |         |                         | ヤーボイ    | 1 mg/kg                | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Nivo+PEM+CDDP            | 21日     | 4コース→Nivo維持へ            | オブジーボ   | 360 mg/body            | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アリムタ    | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | シスプラチン  | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Nivo+PEM+CBDCA           | 21日     | 4コース→Nivo維持へ            | オブジーボ   | 360 mg/body            | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | アリムタ    | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | カルボプラチン | 6 AUC                  | 点滴   | 1              |                      |
| 【NSCLC】Nivo+GEM+CDDP            | 21日     | 4コース→Nivo維持へ            | オブジーボ   | 360 mg/body            | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | ゲムシタピン  | 1250 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1              |                      |
|                                 |         |                         | シスプラチン  | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1              |                      |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                                 | 1コースの日数 | 予定コース数                       | 使用抗がん薬                                | 投与量  | 投与方法                 | 投与日                      |                               |
|---------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 【NSCLC】Nivo+GEM+CBDCA                 | 21日     | 4コース→Nivo_維持へ                | オブジーボ<br>ゲムシタビン<br>カルボプラチン            | 360 mg/body<br>1000 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC   | 点滴<br>点滴<br>点滴       | 1<br>1<br>1              |                               |
| 【NSCLC】Nivo_維持                        | 21日     | 最長2年間                        | オブジーボ                                 | 360 mg/body  | 点滴                   | 1                        |                               |
| 【NSCLC】Necitumumab+GEM+CDDP           | 21日     | 最大4コース→Necitumumab維持へ        | ポートラーザ<br>ゲムシタビン<br>シスプラチン            | 800 mg/body<br>1250 mg/m <sup>2</sup><br>75 mg/m <sup>2</sup>                                  | 点滴<br>点滴<br>点滴       | 1,8<br>1,8<br>1          |                               |
| 【NSCLC】Necitumumab                    | 21日     | PDまで                         | ポートラーザ                                | 800 mg/body  | 点滴                   | 1,8                      |                               |
| 【NSCLC】Pembro+PTX+CBDCA               | 21日     | 4コース→Pembro q3wで35回またはPDまで投与 | キイトルーダ<br>パクリタキセル<br>カルボプラチン          | 200 mg/body<br>200 mg/m <sup>2</sup><br>6 AUC  | 点滴<br>点滴<br>点滴       | 1<br>1<br>1              |                               |
| 【NSCLC】weeklyPTX                      | 28日     | PDまで                         | パクリタキセル                               | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                   | 1,8,15                   |                               |
| 【NSCLC】Nivo+PTX+CBDCA_術前              | 21日     | 3コース                         | オブジーボ<br>パクリタキセル<br>カルボプラチン           | 360 mg/body<br>200 mg/m <sup>2</sup><br>6 AUC  | 点滴<br>点滴<br>点滴       | 1<br>1<br>1              |                               |
| 【NSCLC】Nivo+PEM+CDDP_術前               | 21日     | 3コース                         | オブジーボ<br>ペムトレキセド<br>シスプラチン            | 360 mg/body<br>500 mg/m <sup>2</sup><br>75 mg/m <sup>2</sup>                                   | 点滴<br>点滴<br>点滴       | 1<br>1<br>1              |                               |
| 【NSCLC】Treme+Durva+nab-PTX+CBDCA      | 21日     | 4コース→Treme+Durva維持療法         | イジウド<br>イミフィンジ<br>アブラキサン<br>カルボプラチン   | 75 mg/body<br>1500 mg/body<br>100 mg/m <sup>2</sup><br>6 AUC                                   | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1,8,15<br>1    | 体重30kg以下は20mg/kg              |
| 【NSCLC】Treme+Durva_維持                 | 28日     | PDまで                         | イジウド<br>イミフィンジ                        | 75 mg/body<br>1500 mg/body   | 点滴<br>点滴             | 29<br>1, (29)            | 1+2コース目のみ<br>体重30kg以下は20mg/kg |
| 【NSCLC】Treme+Durva+PEM+CBDCA          | 21日     | 4コース→Treme+Durva+PEM維持療法     | イジウド<br>イミフィンジ<br>ペムトレキセド<br>カルボプラチン  | 75 mg/body<br>1500 mg/body<br>500 mg/m <sup>2</sup><br>6 AUC                                   | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1<br>1         | 体重30kg以下は20mg/kg              |
| 【NSCLC】Treme+Durva+PEM_維持             | 28日     | PDまで                         | イジウド<br>イミフィンジ<br>ペムトレキセド             | 75 mg/body<br>1500 mg/body<br>500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴<br>点滴<br>点滴       | 29<br>1, (29)<br>1, (29) | 1+2コース目のみ<br>体重30kg以下は20mg/kg |
| <b>中皮腫</b>                            |         |                              |                                       |  |                      |                          |                               |
| 【中皮腫】PEM+CDDP(プロイメント <sup>ver</sup> ) | 21日     | 4コース                         | アリムタ<br>シスプラチン                        | 500 mg/m <sup>2</sup><br>75 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴<br>点滴             | 1<br>1                   |                               |
| 【中皮腫】PEM+CDDP                         | 21日     | 4コース                         | アリムタ<br>シスプラチン                        | 500 mg/m <sup>2</sup><br>75 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴<br>点滴             | 1<br>1                   |                               |
| 【中皮腫】PEM+CBDCA                        | 21日     | 6コース                         | アリムタ<br>カルボプラチン                       | 500 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC   | 点滴<br>点滴             | 1<br>1                   |                               |
| 【中皮腫】PEM                              | 21日     | PDまで                         | アリムタ                                  | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                   | 1                        |                               |
| 【中皮腫】Nivo                             | 14日     | PDまで                         | オブジーボ                                 | 240 mg/body<br>480 mg/body   | 点滴<br>点滴             | 1<br>1                   | q2w<br>q4w                    |
| 【中皮腫】Nivo+Ipi                         | 42日     | 最長2年間                        | オブジーボ<br>ヤーボイ                         | 360 mg/body<br>1 mg/kg   | 点滴<br>点滴             | 1,22<br>1                |                               |
| <b>呼吸器他</b>                           |         |                              |                                       |  |                      |                          |                               |
| 【胸腺腫】ADOC(DXR+CDDP+VCR+CPA)           | 21日     |                              | ドキシソルビシン<br>シスプラチン<br>オンコピン<br>エンドキサン | 40 mg/m <sup>2</sup><br>50 mg/m <sup>2</sup><br>0.6 mg/m <sup>2</sup><br>700 mg/m <sup>2</sup> | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>3<br>4         | 最大2mg/body                    |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名                          | 1コースの日数 | 予定コース数                 | 使用抗がん薬                               | 投与量  | 投与方法                       | 投与日   |
|--------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---|
| <b>乳</b>                       |         |                        |                                      |  |                            |   |
| 【乳】DXR+CPA (AC)(アロリスver)       | 21日     | 4コース(進行再発は6コース)        | ドキシソルピシン<br>エンドキサン                   | 60 mg/m <sup>2</sup><br>600 mg/m <sup>2</sup>                            | 点滴<br>点滴                   | 1<br>1  |
| 【乳】DXR+CPA (AC)                | 21日     | 4コース(進行再発は6コース)        | ドキシソルピシン<br>エンドキサン                   | 60 mg/m <sup>2</sup><br>600 mg/m <sup>2</sup>                            | 点滴<br>点滴                   | 1<br>1  |
| 【乳】EPI+CPA (EC)                | 21日     | 4コース(進行再発は8コース)        | エピルピシン<br>エンドキサン                     | 90 mg/m <sup>2</sup><br>600 mg/m <sup>2</sup>                            | 点滴<br>点滴                   | 1<br>1<br>進行再発は75mg/m2  |
| 【乳】EPI+CPA (EC)(アロリスver)       | 21日     | 4コース(進行再発は8コース)        | エピルピシン<br>エンドキサン                     | 90 mg/m <sup>2</sup><br>600 mg/m <sup>2</sup>                            | 点滴<br>点滴                   | 1<br>1<br>進行再発は75mg/m2  |
| 【乳】CPA+DOC (TC)                | 21日     | 4コース                   | エンドキサン<br>ドセタキセル                     | 600 mg/m <sup>2</sup><br>75 mg/m <sup>2</sup>                            | 点滴<br>点滴                   | 1<br>1  |
| 【乳】EPI+CPA+5-FU (FEC)(アロリスver) | 21日     | 6コース                   | エピルピシン<br>エンドキサン<br>5-FU             | 100 mg/m <sup>2</sup><br>500 mg/m <sup>2</sup><br>500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴<br>点滴<br>点滴             | 1<br>1<br>1<br>進行再発は75mg/m2                                   |
| 【乳】EPI+CPA+5-FU (FEC)          | 21日     | 6コース                   | エピルピシン<br>エンドキサン<br>5-FU             | 100 mg/m <sup>2</sup><br>500 mg/m <sup>2</sup><br>500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴<br>点滴<br>点滴             | 1<br>1<br>1<br>進行再発は75mg/m2                                   |
| 【乳】dose-dense DXR+CPA          | 14日     | 4コース→dd-PTXレジメンへ       | ドキシソルピシン<br>エンドキサン                   | 60 mg/m <sup>2</sup><br>600 mg/m <sup>2</sup>                            | 点滴<br>点滴                   | 1<br>1  |
| 【乳】dose-dense DXR+CPA(アロリスver) | 14日     | 4コース→dd-PTXレジメンへ       | ドキシソルピシン<br>エンドキサン                   | 60 mg/m <sup>2</sup><br>600 mg/m <sup>2</sup>                            | 点滴<br>点滴                   | 1<br>1  |
| 【乳】dose-dense EPI+CPA          | 14日     | 4コース→dd-PTXレジメンへ       | エピルピシン<br>エンドキサン                     | 90 mg/m <sup>2</sup><br>600 mg/m <sup>2</sup>                            | 点滴<br>点滴                   | 1<br>1  |
| 【乳】dose-dense EPI+CPA(アロリスver) | 14日     | 4コース→dd-PTXレジメンへ       | エピルピシン<br>エンドキサン                     | 90 mg/m <sup>2</sup><br>600 mg/m <sup>2</sup>                            | 点滴<br>点滴                   | 1<br>1  |
| 【乳】weeklyPTX                   | 7日      | 術前術後:12コース、進行再発:PDまで   | パクリタキセル                              | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                         | 1   |
| 【乳】DOC                         | 21日     | 4コース(進行再発:PDまで)        | ドセタキセル                               | 60 mg/m <sup>2</sup><br>75 mg/m <sup>2</sup>                             | 点滴<br>点滴                   | 1<br>1<br>進行再発<br>術前術後  |
| 【乳】dose-dense PTX              | 14日     | 4コース                   | パクリタキセル                              | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                         | 1   |
| 【乳】Tmab+PTX                    | 7日      | 12コース(進行再発はPDまで)       | ハーセプチン<br>パクリタキセル                    | 4 mg/kg<br>2 mg/kg<br>80 mg/m <sup>2</sup>                               | 点滴<br>点滴<br>点滴             | 1<br>1<br>1<br>初回<br>2回目以降                                    |
| 【乳】Tmab+DOC                    | 21日     | (術前術後)6コース、(進行再発)PDまで  | ハーセプチン<br>ドセタキセル                     | 8 mg/kg<br>6 mg/kg<br>75 mg/m <sup>2</sup>                               | 点滴<br>点滴<br>点滴             | 1<br>1<br>1<br>初回<br>2回目以降<br>60~75mg/m2                      |
| 【乳】pertuzumab+Tmab+DOC         | 21日     | PDまで(術前術後は12カ月)        | パージェタ<br>ハーセプチン<br>ドセタキセル            | 840 mg/body<br>420 mg/body<br>8 mg/kg<br>6 mg/kg<br>75 mg/m <sup>2</sup> | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>初回<br>2回目以降<br>初回<br>2回目以降           |
| 【乳】Tmab (q3w)                  | 21日     | (術前術後)18コース、(進行再発)PDまで | ハーセプチン                               | 8 mg/kg<br>6 mg/kg   | 点滴<br>点滴                   | 1<br>1<br>初回<br>2回目以降   |
| 【乳】Tmab (q1w)                  | 7日      | (進行再発)PDまで             | ハーセプチン                               | 4 mg/kg<br>2 mg/kg   | 点滴<br>点滴                   | 1<br>1<br>初回<br>2回目以降   |
| 【乳】nab-PTX                     | 21日     | PDまで                   | アブラキサン                               | 260 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                         | 1   |
| 【乳】VNR                         | 21日     | PDまで                   | ロゼウス                                 | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                         | 1,8   |
| 【乳】GEM                         | 21日     | PDまで                   | ゲムシタピン                               | 1250 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                         | 1,8   |
| 【乳】eribulin                    | 21日     | PDまで                   | ハラヴェン                                | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 静注                         | 1,8   |
| 【乳】pertuzumab+Tmab             | 21日     | PDまで(術前術後は12カ月)        | パージェタ<br>ハーセプチン                      | 840 mg/body<br>420 mg/body<br>8 mg/kg<br>6 mg/kg                         | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴       | 1<br>1<br>1<br>1<br>初回<br>2回目以降<br>初回<br>2回目以降                |
| 【乳】pertuzumab+Tmab+PTX         | 21日     | PDまで(術前術後は12カ月)        | パージェタ<br>ハーセプチン<br>ドセタキセル<br>パクリタキセル | 840 mg/body<br>420 mg/body<br>8 mg/kg<br>6 mg/kg<br>80 mg/m <sup>2</sup> | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>初回<br>2回目以降<br>初回<br>2回目以降<br>1,8,15 |
| 【乳】T-DM1                       | 21日     | (進行再発)PDまで、(術後)14コース   | カドサイラ                                | 3.6 mg/kg  | 点滴                         | 1   |
| 【乳】Tmab+VNR                    | 21日     | 6コース                   | ハーセプチン<br>ロゼウス                       | 8 mg/kg<br>6 mg/kg<br>25 mg/m <sup>2</sup>                               | 点滴<br>点滴<br>点滴             | 1<br>1<br>1<br>初回<br>2回目以降                                    |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注)臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名   | 1コースの日数 | 予定コース数                 | 使用抗がん薬  | 投与量                    | 投与方法 | 投与日                      |          |
|---|---------|------------------------|---------|------------------------|------|--------------------------|----------|
| 【乳】Tmab+GEM                                     | 21日     | PDまで                   | ハーセプチン  | 8 mg/kg                | 点滴   | 1                        | 初回       |
|   |         |                        |         | 6 mg/kg                | 点滴   | 1                        | 2回目以降    |
|   |         |                        | ゲムシタビン  | 1250 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8                      |          |
| 【乳】Tmab+eribulin                                | 21日     | PDまで                   | ハーセプチン  | 8 mg/kg                | 点滴   | 1                        | 初回       |
|   |         |                        |         | 6 mg/kg                | 点滴   | 1                        | 2回目以降    |
|   |         |                        | ハラヴェン   | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 静注   | 1,8                      |          |
| 【乳】S-1+Tmab                                     | 21日     | PDまで                   | ハーセプチン  | 8 mg/kg                | 点滴   | 1                        | 初回       |
|   |         |                        |         | 6 mg/kg                | 点滴   | 1                        | 2回目以降    |
|   |         |                        | ティーエスワン | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-14                     |          |
| 【乳】weeklyPTX+BV                                 | 28日     | PDまで                   | パクリタキセル | 90 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,8,15                   |          |
|   |         |                        | アバスタチン  | 10 mg/kg               | 点滴   | 1,15                     |          |
| 【乳】Atezo+nab-PTX                                | 28日     | PDまで                   | テセントリク  | 840 mg/body            | 点滴   | 1,15                     |          |
|   |         |                        | アブラキサン  | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15                   |          |
| 【乳】ENHERTU(アロカリスver)                            | 21日     | PDまで                   | エンハーツ   | 5.4 mg/kg              | 点滴   | 1                        |          |
| 【乳】ENHERTU                                      | 21日     | PDまで                   | エンハーツ   | 5.4 mg/kg              | 点滴   | 1                        |          |
| 【乳】Pembro+GEM+CBDCA、CPS $\geq$ 10               | 21日     | PDまで                   | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1                        |          |
|   |         |                        | ゲムシタビン  | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8                      |          |
|   |         |                        | カルボプラチン | 2 AUC                  | 点滴   | 1,8                      |          |
| 【乳】Pembro+PTX、CPS $\geq$ 10                     | 84日     | PDまで                   | キイトルーダ  | 400 mg/body            | 点滴   | 1,43                     |          |
|   |         |                        | パクリタキセル | 90 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,8,15,29,36,43,57,64,71 |          |
|   |         |                        |         |                        |      |                          |          |
| 【乳】pertuzumab+Tmab+VNR                          | 21日     | PDまで                   | パージェタ   | 840 mg/body            | 点滴   | 1                        | 初回       |
|   |         |                        |         | 420 mg/body            | 点滴   | 1                        | 2回目以降    |
|   |         |                        | ハーセプチン  | 8 mg/kg                | 点滴   | 1                        | 初回       |
|   |         |                        |         | 6 mg/kg                | 点滴   | 1                        | 2回目以降    |
|   |         |                        | ロゼウス    | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,8                      |          |
| 【乳】pertuzumab+Tmab+eribulin                     | 21日     | PDまで                   | パージェタ   | 840 mg/body            | 点滴   | 1                        | 初回       |
|   |         |                        |         | 420 mg/body            | 点滴   | 1                        | 2回目以降    |
|   |         |                        | ハーセプチン  | 8 mg/kg                | 点滴   | 1                        | 初回       |
|   |         |                        |         | 6 mg/kg                | 点滴   | 1                        | 2回目以降    |
|   |         |                        | ハラヴェン   | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8                      |          |
| 【乳】pertuzumab+Tmab+DOC+CBDCA (TCb+HP)(アロカリスver) | 21日     | 6コース                   | パージェタ   | 420 mg/body            | 点滴   | 1                        | 初回       |
|   |         |                        |         | 480 mg/body            | 点滴   | 1                        | 2回目以降    |
|   |         |                        | ハーセプチン  | 8 mg/kg                | 点滴   | 1                        | 初回       |
|   |         |                        |         | 6 mg/body              | 点滴   | 1                        | 2回目以降    |
|   |         |                        | ドセタキセル  | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                        |          |
| 【乳】pertuzumab+Tmab+DOC+CBDCA (TCb+HP)           | 21日     | 6コース                   | パージェタ   | 420 mg/body            | 点滴   | 1                        | 初回       |
|   |         |                        |         | 480 mg/body            | 点滴   | 1                        | 2回目以降    |
|   |         |                        | ハーセプチン  | 8 mg/kg                | 点滴   | 1                        | 初回       |
|   |         |                        |         | 6 mg/body              | 点滴   | 1                        | 2回目以降    |
|   |         |                        | ドセタキセル  | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                        |          |
| 【乳】Pembro+weeklyPTX+weeklyCBDCA                 | 21日     | 4コース                   | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1                        |          |
|   |         |                        | パクリタキセル | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,8,15                   |          |
|   |         |                        | カルボプラチン | 1.5 AUC                | 点滴   | 1,8,15                   | Max225mg |
|   |         |                        |         |                        |      |                          |          |
|   |         |                        |         |                        |      |                          |          |
| 【乳】Pembro+weeklyPTX+CBDCA(AUC: 21日5)            | 21日     | 4コース                   | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1                        |          |
|   |         |                        | パクリタキセル | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,8,15                   |          |
|   |         |                        | カルボプラチン | 5 AUC                  | 点滴   | 1                        | Max750mg |
|   |         |                        |         |                        |      |                          |          |
|   |         |                        |         |                        |      |                          |          |
| 【乳】Pembro+weeklyPTX+CBDCA(AUC: 21日5)(アロカリスver)  | 21日     | 4コース                   | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1                        |          |
|   |         |                        | パクリタキセル | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,8,15                   |          |
|   |         |                        | カルボプラチン | 5 AUC                  | 点滴   | 1                        | Max750mg |
|   |         |                        |         |                        |      |                          |          |
|   |         |                        |         |                        |      |                          |          |
| 【乳】Pembro+EC (EPI+CPA) (アロカリスver)               | 21日     | 4コース                   | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1                        |          |
|   |         |                        | エピルピシン  | 90 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                        |          |
|   |         |                        | エンドキサン  | 600 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                        |          |
| 【乳】Pembro+EC (EPI+CPA)                          | 21日     | 4コース                   | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1                        |          |
|   |         |                        | エピルピシン  | 90 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                        |          |
|   |         |                        | エンドキサン  | 600 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                        |          |
| 【乳】Pembro                                       | 21日     | 9コース(q3w) or 5コース(q6w) | キイトルーダ  | 200 mg/body            | 点滴   | 1                        |          |
|   |         |                        |         | 400 mg/body            | 点滴   | 1                        |          |

PD: Progressive Disease, AUC: カル/パート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                                | 1コースの日数 | 予定コース数            | 使用抗がん薬                    | 投与量  | 投与方法           | 投与日                        |
|--------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|--|----------------|----------------------------|
| <b>食道</b>                            |         |                   |                           |  |                |                            |
| 【食道】DOC+NDP                          | 14日     | PDまで              | ドセタキセル<br>アクブラ            | 30 mg/m <sup>2</sup><br>40 mg/m <sup>2</sup>                           | 点滴<br>点滴       | 1<br>1                     |
| 【食道】DOC                              | 21日     | PDまで              | ドセタキセル                    | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴             | 1                          |
| 【食道】weeklyPTX                        | 28日     | PDまで              | パクリタキセル                   | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴             | 1,8,15                     |
| 【食道】RT+CDDP+5-FU                     | 28日     | 2コース              | シスプラチン<br>5-FU            | 70 mg/m <sup>2</sup><br>700 mg/m <sup>2</sup>                          | 点滴<br>点滴       | 1<br>1-4                   |
| 【食道】RT+CDDP+5-FU(アロカリスver)           | 28日     | 2コース              | シスプラチン<br>5-FU            | 70 mg/m <sup>2</sup><br>700 mg/m <sup>2</sup>                          | 点滴<br>点滴       | 1<br>1-4                   |
| 【食道】CDDP+5-FU 進行再発                   | 28日     | PDまで              | シスプラチン<br>5-FU            | 80 mg/m <sup>2</sup><br>800 mg/m <sup>2</sup>                          | 点滴<br>点滴       | 1<br>1-5                   |
| 【食道】CDDP+5-FU 進行再発(アロカリスver)         | 28日     | PDまで              | シスプラチン<br>5-FU            | 80 mg/m <sup>2</sup><br>800 mg/m <sup>2</sup>                          | 点滴<br>点滴       | 1<br>1-5                   |
| 【食道】CDDP+5-FU 術前術後                   | 21日     | 2コース              | シスプラチン<br>5-FU            | 80 mg/m <sup>2</sup><br>800 mg/m <sup>2</sup>                          | 点滴<br>点滴       | 1<br>1-5                   |
| 【食道】CDDP+5-FU 術前術後(アロカリスver)         | 21日     | 2コース              | シスプラチン<br>5-FU            | 80 mg/m <sup>2</sup><br>800 mg/m <sup>2</sup>                          | 点滴<br>点滴       | 1<br>1-5                   |
| 【食道】NDP+5-FU                         | 28日     | PDまで(RT併用時は2コース)  | アクブラ<br>5-FU              | 90 mg/m <sup>2</sup><br>800 mg/m <sup>2</sup>                          | 点滴<br>点滴       | 1<br>1-5                   |
| 【食道】DOC+5-FU+CDDP                    | 14日     |                   | ドセタキセル<br>5-FU<br>シスプラチン  | 35 mg/m <sup>2</sup><br>350 mg/m <sup>2</sup><br>6 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1-5<br>1-5            |
| 【食道】(術前)DOC+CDDP+5-FU                | 21日     | 2コース(最大3コース)      | ドセタキセル<br>シスプラチン<br>5-FU  | 70 mg/m <sup>2</sup><br>70 mg/m <sup>2</sup><br>750 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1-5              |
| 【食道】RT+low dose CDDP+5-FU            | 7日      |                   | シスプラチン<br>5-FU            | 5 mg/body<br>250 mg/body   | 点滴<br>点滴       | 1-5<br>1-5                 |
| 【食道】mFOLFOX6(LV+L-OHP+5FU)           | 14日     | PDまで              | レボホリナート<br>エルプラット<br>5-FU | 200 mg/m <sup>2</sup><br>85 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1                |
|                                      |         |                   |                           | 2400 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴             | 1~ bolus<br>civ            |
| 【食道】mFOLFOX6(LV+L-OHP+5FU)(アロカリスver) | 14日     | PDまで              | レボホリナート<br>エルプラット<br>5-FU | 200 mg/m <sup>2</sup><br>85 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1                |
|                                      |         |                   |                           | 2400 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴             | 1~ bolus<br>civ            |
| 【食道】Nivo                             | 日       | PDまで              | オブジーボ                     | 240 mg/body<br>480 mg/body   | 点滴<br>点滴       | 1<br>1                     |
|                                      |         |                   |                           |  |                | q2w<br>q4w                 |
| 【食道】Pembro+CDDP+5-FU(アロカリスver)       | 21日     | 6コース              | キイトルーダ<br>シスプラチン<br>5-FU  | 200 mg/body<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>800 mg/m <sup>2</sup>           | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1-5              |
| 【食道】Pembro+CDDP+5-FU                 | 21日     | 6コース              | キイトルーダ<br>シスプラチン<br>5-FU  | 200 mg/body<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>800 mg/m <sup>2</sup>           | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1-5              |
| 【食道】Pembro+5-FU維持                    | 21日     | 29コース             | キイトルーダ<br>5-FU            | 200 mg/body<br>800 mg/m <sup>2</sup>                                   | 点滴<br>点滴       | 1<br>1-5                   |
| 【食道】術後Nivo                           | 日       | 最長1年間             | オブジーボ                     | 240 mg/body<br>480 mg/body   | 点滴<br>点滴       | 1<br>1                     |
|                                      |         |                   |                           |  |                | q2w_8コース目まで<br>q4w_9コース目以降 |
| 【食道】Ipi+Nivo(Ipi ≤ 120mg)            | 42日     | 最長24ヵ月間           | オブジーボ<br>ヤーボイ             | 360 mg/body<br>1 mg/kg   | 点滴<br>点滴       | 1,22<br>1                  |
| 【食道】Nivo+CDDP+5-FU                   | 28日     | PDまで(Nivoは最長24ヵ月) | オブジーボ<br>シスプラチン<br>5-FU   | 480 mg/body<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>800 mg/m <sup>2</sup>           | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1-5              |
| 【食道】Nivo+CDDP+5-FU(アロカリスver)         | 28日     | PDまで(Nivoは最長24ヵ月) | オブジーボ<br>シスプラチン<br>5-FU   | 480 mg/body<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>800 mg/m <sup>2</sup>           | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1-5              |
| 【食道】Pembro                           | 日       | PDまで(最長2年間)       | キイトルーダ                    | 200 mg/body<br>400 mg/body   | 点滴<br>点滴       | 1<br>1                     |
|                                      |         |                   |                           |  |                | q3w<br>q6w                 |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注)臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません



| レジメン名                               | 1コースの日数 | 予定コース数              | 使用抗がん薬                      | 投与量  | 投与方法                 | 投与日                                      |
|-------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------|--|----------------------|--|
| <b>胃</b>                            |         |                     |                             |  |                      |  |
| 【胃】S-1+CDDP                         | 35日     | PDまで                | ティーエスワン<br>シスプラチン           | 80 mg/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup>                           | 経口<br>点滴             | 1-21<br>8<br>分2                          |
| 【胃】S-1+CDDP(アロリスver)                | 35日     | PDまで                | ティーエスワン<br>シスプラチン           | 80 mg/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup>                           | 経口<br>点滴             | 1-21<br>8<br>分2                          |
| 【胃】SOX (S-1+L-OHP)(アロリスver)         | 21日     | PDまで                | ティーエスワン<br>エルプラット           | 80 mg/m <sup>2</sup><br>130 mg/m <sup>2</sup>                          | 経口<br>点滴             | 1-14<br>1<br>分2<br>100mg/m2もあり           |
| 【胃】SOX (S-1+L-OHP)                  | 21日     | PDまで                | ティーエスワン<br>エルプラット           | 80 mg/m <sup>2</sup><br>130 mg/m <sup>2</sup>                          | 経口<br>点滴             | 1-14<br>1<br>分2<br>100mg/m2もあり           |
| 【胃】XELOX (Cape+L-OHP)(アロリスver)      | 21日     | PDまで(術後は<br>8コースまで) | ゼローダ<br>エルプラット              | 2000 mg/m <sup>2</sup><br>130 mg/m <sup>2</sup>                        | 経口<br>点滴             | 1-14<br>1<br>分2                          |
| 【胃】XELOX (Cape+L-OHP)               | 21日     | PDまで(術後は<br>8コースまで) | ゼローダ<br>エルプラット              | 2000 mg/m <sup>2</sup><br>130 mg/m <sup>2</sup>                        | 経口<br>点滴             | 1-14<br>1<br>分2                          |
| 【胃】mFOLFOX6(アロリスver)                | 14日     | PDまで                | レボホリナート<br>エルプラット<br>5-FU   | 200 mg/m <sup>2</sup><br>85 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴<br>点滴<br>点滴       | 1<br>1<br>1<br>bolus                     |
| 【胃】mFOLFOX6                         | 14日     | PDまで                | レボホリナート<br>エルプラット<br>5-FU   | 200 mg/m <sup>2</sup><br>85 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴<br>点滴<br>点滴       | 1<br>1<br>1<br>bolus<br>civ              |
| 【胃】S-1+DOC                          | 21日     | PDまで(術後は<br>特記事項参照) | ティーエスワン<br>ドセタキセル           | 80 mg/m <sup>2</sup><br>40 mg/m <sup>2</sup>                           | 経口<br>点滴             | 1-14<br>1<br>分2                          |
| 【胃】RAM+PTX                          | 28日     | PDまで                | サイラムザ<br>パクリタキセル            | 8 mg/kg<br>80 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴<br>点滴             | 1,15<br>1,8,15                           |
| 【胃】RAM+nab-PTX                      | 28日     | PDまで                | サイラムザ<br>アブラキサン             | 8 mg/kg<br>100 mg/m <sup>2</sup>                                       | 点滴<br>点滴             | 1,15<br>1,8,15                           |
| 【胃】RAM                              | 14日     | PDまで                | サイラムザ                       | 8 mg/kg  | 点滴                   | 1  |
| 【胃】DOC                              | 21日     | PDまで                | ドセタキセル                      | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                   | 1  |
| 【胃】CPT-11                           | 14日     | PDまで                | イリノテカン                      | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                   | 1  |
| 【胃】weekly nab-PTX                   | 28日     | PDまで                | アブラキサン                      | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                   | 1,8,15                                   |
| 【胃】weeklyPTX                        | 28日     | PDまで                | パクリタキセル                     | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                   | 1,8,15                                   |
| 【胃】Cape+Tmab+CDDP(アロリスver)          | 21日     | 6コース→Tmab<br>単独     | ゼローダ<br>ハーセプチン<br>シスプラチン    | 2000 mg/m <sup>2</sup><br>8 mg/kg<br>6 mg/kg<br>80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1-14<br>1<br>1<br>1<br>分2<br>初回<br>2回目以降 |
| 【胃】Cape+Tmab+CDDP                   | 21日     | 6コース→Tmab<br>単独     | ゼローダ<br>ハーセプチン<br>シスプラチン    | 2000 mg/m <sup>2</sup><br>8 mg/kg<br>6 mg/kg<br>80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1-14<br>1<br>1<br>1<br>分2<br>初回<br>2回目以降 |
| 【胃】S-1+Tmab+CDDP                    | 21日     | PDまで                | ティーエスワン<br>ハーセプチン<br>シスプラチン | 80 mg/m <sup>2</sup><br>8 mg/kg<br>6 mg/kg<br>60 mg/m <sup>2</sup>     | 経口<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1-14<br>1<br>1<br>1<br>分2<br>初回<br>2回目以降 |
| 【胃】S-1+Tmab+CDDP(アロリスver)           | 21日     | PDまで                | ティーエスワン<br>ハーセプチン<br>シスプラチン | 80 mg/m <sup>2</sup><br>8 mg/kg<br>6 mg/kg<br>60 mg/m <sup>2</sup>     | 経口<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1-14<br>1<br>1<br>1<br>分2<br>初回<br>2回目以降 |
| 【胃】Tmab+XELOX (Cape+L-OHP)          | 21日     | PDまで                | ゼローダ<br>ハーセプチン<br>エルプラット    | 2000 mg/m <sup>2</sup><br>8 mg/kg<br>6 mg/kg<br>100 mg/m <sup>2</sup>  | 経口<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1-14<br>1<br>1<br>1<br>分2<br>初回<br>2回目以降 |
| 【胃】Tmab+XELOX (Cape+L-OHP)(アロリスver) | 21日     | PDまで                | ゼローダ<br>ハーセプチン<br>エルプラット    | 2000 mg/m <sup>2</sup><br>8 mg/kg<br>6 mg/kg<br>100 mg/m <sup>2</sup>  | 経口<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1-14<br>1<br>1<br>1<br>分2<br>初回<br>2回目以降 |
| 【胃】Tmab+SOX (S-1+L-OHP)(アロリスver)    | 21日     | PDまで                | ティーエスワン<br>ハーセプチン<br>エルプラット | 80 mg/m <sup>2</sup><br>8 mg/kg<br>6 mg/kg<br>100 mg/m <sup>2</sup>    | 経口<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1-14<br>1<br>1<br>1<br>分2<br>初回<br>2回目以降 |
| 【胃】Tmab+SOX (S-1+L-OHP)             | 21日     | PDまで                | ティーエスワン<br>ハーセプチン<br>エルプラット | 80 mg/m <sup>2</sup><br>8 mg/kg<br>6 mg/kg<br>100 mg/m <sup>2</sup>    | 経口<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1-14<br>1<br>1<br>1<br>分2<br>初回<br>2回目以降 |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注)臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                               | 1コースの日数 | 予定コース数        | 使用抗がん薬  | 投与量                    | 投与方法 | 投与日  |       |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------|------------------------|------|------|-------|
| 【胃】Tmab+nab-PTX                     | 21日     | PDまで          | ハーセプチン  | 8 mg/kg                | 点滴   | 1    | 初回    |
|                                     |         |               |         | 6 mg/kg                | 点滴   | 1    | 2回目以降 |
|                                     |         |               | アブラキサン  | 260 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1    |       |
| 【胃】S-1+Tmab                         | 21日     | PDまで          | ハーセプチン  | 8 mg/kg                | 点滴   | 1    | 初回    |
|                                     |         |               |         | 6 mg/kg                | 点滴   | 1    | 2回目以降 |
|                                     |         |               | ティーエスワン | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-14 |       |
| 【胃】Cape+Tmab                        | 21日     | PDまで          | ゼローダ    | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 経口   | 1-14 | 分2    |
|                                     |         |               | ハーセプチン  | 8 mg/kg                | 点滴   | 1    | 初回    |
|                                     |         |               |         | 6 mg/kg                | 点滴   | 1    | 2回目以降 |
| 【胃】S-1+DOC+CDDP(アロカリスver)           | 28日     | PDまで          | ティーエスワン | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-14 | 分2    |
|                                     |         |               | ドセタキセル  | 35 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,15 |       |
|                                     |         |               | シスプラチン  | 35 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,15 |       |
| 【胃】S-1+DOC+CDDP                     | 28日     | PDまで          | ティーエスワン | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-14 | 分2    |
|                                     |         |               | ドセタキセル  | 35 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,15 |       |
|                                     |         |               | シスプラチン  | 35 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,15 |       |
| 【胃】biweeklyCPT-11+CDDP              | 14日     | PDまで          | イリノテカン  | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | シスプラチン  | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1    |       |
| 【胃】biweeklyCPT-11+CDDP(アロカリスver)    | 14日     | PDまで          | イリノテカン  | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | シスプラチン  | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1    |       |
| 【胃】Nivo                             | 日       | PDまで          | オブジーボ   | 240 mg/body            | 点滴   | 1    | q2w   |
|                                     |         |               |         | 480 mg/body            | 点滴   | 1    | q4w   |
| 【胃】ENHERTU                          | 21日     | PDまで          | エンハーツ   | 6.4 mg/kg              | 点滴   | 1    |       |
| 【胃】ENHERTU(アロカリスver)                | 21日     | PDまで          | エンハーツ   | 6.4 mg/kg              | 点滴   | 1    |       |
| 【胃】Nivo+SOX(S-1+L-OHP)(アロカリスver)    | 21日     | PDまで          | オブジーボ   | 360 mg/body            | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | エルプラット  | 130 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | ティーエスワン | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-14 | 1日2回  |
| 【胃】Nivo+SOX(S-1+L-OHP)              | 21日     | PDまで          | オブジーボ   | 360 mg/body            | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | エルプラット  | 130 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | ティーエスワン | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-14 | 1日2回  |
| 【胃】Nivo+XELOX(Cape+L-OHP)           | 21日     | PDまたは最長24ヶ月まで | オブジーボ   | 360 mg/body            | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | エルプラット  | 130 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | ゼローダ    | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1-14 | 1日2回  |
| 【胃】Nivo+XELOX(Cape+L-OHP)(アロカリスver) | 21日     | PDまたは最長24ヶ月まで | オブジーボ   | 360 mg/body            | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | エルプラット  | 130 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | ゼローダ    | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1-14 | 1日2回  |
| 【胃】Nivo+mFOLFOX6                    | 14日     | PDまたは最長24ヶ月まで | オブジーボ   | 240 mg/body            | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | エルプラット  | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | レボホリナート | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | 5-FU    | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1    | bolus |
|                                     |         |               |         | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1~   | civ   |
| 【胃】Nivo+mFOLFOX6(アロカリスver)          | 14日     | PDまたは最長24ヶ月まで | オブジーボ   | 240 mg/body            | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | エルプラット  | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | レボホリナート | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | 5-FU    | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1    | bolus |
|                                     |         |               |         | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1~   | civ   |
| 【胃】DOS(S-1+DOC+L-OHP)(アロカリスver)     | 21日     | 術前3コース        | ドセタキセル  | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | エルプラット  | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | ティーエスワン | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-14 | 分2    |
| 【胃】DOS(S-1+DOC+L-OHP)               | 21日     | 術前3コース        | ドセタキセル  | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | エルプラット  | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1    |       |
|                                     |         |               | ティーエスワン | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-14 | 分2    |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                                    | 1コースの日数 | 予定コース数          | 使用抗がん薬                                | 投与量  | 投与方法                 | 投与日                              |
|--|---------|-----------------|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| <b>大腸</b>                                |         |                 |                                       |  |                      |                                  |
| 【大腸】mFOLFOX6(LV+L-OHP+5FU)               | 14日     | PDまで、術後は12コース   | レボホリナート<br>エルプラット<br>5-FU             | 200 mg/m <sup>2</sup><br>85 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup>                           | 点滴<br>点滴<br>点滴       | 1<br>1<br>1<br>bolus<br>civ      |
|  |         |                 |                                       | 2400 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                   | 1~<br>civ                        |
| 【大腸】mFOLFOX6(LV+L-OHP+5FU)+BV            | 14日     | PDまで            | アバスタチン<br>レボホリナート<br>エルプラット<br>5-FU   | 10 mg/kg<br>200 mg/m <sup>2</sup><br>85 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup>               | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1<br>1<br>bolus<br>civ |
|  |         |                 |                                       | 2400 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                   | 1~<br>civ                        |
| 【大腸】mFOLFOX6(LV+L-OHP+5FU)+Pmab          | 14日     | PDまで            | ベクティビックス<br>レボホリナート<br>エルプラット<br>5-FU | 6 mg/kg<br>200 mg/m <sup>2</sup><br>85 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1<br>1<br>bolus<br>civ |
|  |         |                 |                                       | 2400 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                   | 1~<br>civ                        |
| 【大腸】FOLFIRI(LV+CPT-11+5FU)               | 14日     | PDまで、術後は12コース   | レボホリナート<br>イリノテカン<br>5-FU             | 200 mg/m <sup>2</sup><br>150 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup>                          | 点滴<br>点滴<br>点滴       | 1<br>1<br>1<br>bolus<br>civ      |
|  |         |                 |                                       | 2400 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                   | 1~<br>civ                        |
| 【大腸】FOLFIRI(LV+CPT-11+5FU)+BV            | 14日     | PDまで            | アバスタチン<br>レボホリナート<br>イリノテカン<br>5-FU   | 10 mg/kg<br>200 mg/m <sup>2</sup><br>150 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup>              | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1<br>1<br>bolus<br>civ |
|  |         |                 |                                       | 2400 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                   | 1~<br>civ                        |
| 【大腸】FOLFIRI(LV+CPT-11+5FU)+Pmab          | 14日     | PDまで            | ベクティビックス<br>レボホリナート<br>イリノテカン<br>5-FU | 6 mg/kg<br>200 mg/m <sup>2</sup><br>150 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup>               | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1<br>1<br>bolus<br>civ |
|  |         |                 |                                       | 2400 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                   | 1~<br>civ                        |
| 【大腸】FOLFIRI(LV+CPT-11+5FU)+biweekly Cmab | 14日     | PDまで            | アービタックス<br>レボホリナート<br>イリノテカン<br>5-FU  | 500 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/m <sup>2</sup><br>150 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1<br>1<br>1<br>bolus<br>civ |
|  |         |                 |                                       | 2400 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                   | 1~<br>civ                        |
| 【大腸】XELOX (Cape+L-OHP)                   | 21日     | PDまで(術後は8コースまで) | ゼローダ<br>エルプラット                        | 2000 mg/m <sup>2</sup><br>130 mg/m <sup>2</sup>  | 経口<br>点滴             | 1-14<br>1<br>分2                  |
| 【大腸】XELOX (Cape+L-OHP)+BV                | 21日     | PDまで            | アバスタチン<br>ゼローダ<br>エルプラット              | 7.5 mg/kg<br>2000 mg/m <sup>2</sup><br>130 mg/m <sup>2</sup>                                     | 点滴<br>経口<br>点滴       | 1<br>1-14<br>1<br>分2             |
| 【大腸】XELOX (Cape+L-OHP)+Pmab              | 21日     | PDまで            | ゼローダ<br>ベクティビックス<br>エルプラット            | 2000 mg/m <sup>2</sup><br>6 mg/kg<br>130 mg/m <sup>2</sup>                                       | 経口<br>点滴<br>点滴       | 1-14<br>1<br>1<br>分2             |
| 【大腸】SOX (S-1+L-OHP)                      | 21日     | PDまで            | ティーエスワン<br>エルプラット                     | 80 mg/m <sup>2</sup><br>130 mg/m <sup>2</sup>  | 経口<br>点滴             | 1-14<br>1<br>分2                  |
| 【大腸】SOX (S-1+L-OHP)+BV                   | 21日     | PDまで            | アバスタチン<br>ティーエスワン<br>エルプラット           | 7.5 mg/kg<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>130 mg/m <sup>2</sup>                                       | 点滴<br>経口<br>点滴       | 1<br>1-14<br>1<br>分2             |
| 【大腸】SOX (S-1+L-OHP)+Pmab                 | 21日     | PDまで            | ティーエスワン<br>ベクティビックス<br>エルプラット         | 80 mg/m <sup>2</sup><br>6 mg/kg<br>130 mg/m <sup>2</sup>   | 経口<br>点滴<br>点滴       | 1-14<br>1<br>1<br>分2             |
| 【大腸】IRIS (S-1+CPT-11)                    | 21日     | PDまで            | ティーエスワン<br>イリノテカン                     | 80 mg/m <sup>2</sup><br>150 mg/m <sup>2</sup>  | 経口<br>点滴             | 1-14<br>1<br>分2                  |
| 【大腸】IRIS (S-1+CPT-11)+BV                 | 21日     | PDまで            | ティーエスワン<br>アバスタチン<br>イリノテカン           | 80 mg/m <sup>2</sup><br>7.5 mg/kg<br>150 mg/m <sup>2</sup>                                       | 経口<br>点滴<br>点滴       | 1-14<br>1<br>1<br>分2             |
| 【大腸】IRIS (S-1+CPT-11)+biweekly Cmab      | 28日     | PDまで            | ティーエスワン<br>アービタックス<br>イリノテカン          | 80 mg/m <sup>2</sup><br>500 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup>                           | 経口<br>点滴<br>点滴       | 1-14<br>1,15<br>1,15             |
| 【大腸】IRIS (S-1+CPT-11)+Pmab               | 28日     | PDまで            | ティーエスワン<br>ベクティビックス<br>イリノテカン         | 80 mg/m <sup>2</sup><br>6 mg/kg<br>100 mg/m <sup>2</sup>   | 経口<br>点滴<br>点滴       | 1-14<br>1,15<br>1,15             |
| 【大腸】biweekly Cmab+CPT-11                 | 14日     | PDまで            | アービタックス<br>イリノテカン                     | 500 mg/m <sup>2</sup><br>150 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴<br>点滴             | 1<br>1                           |
| 【大腸】Pmab+CPT-11                          | 14日     | PDまで            | ベクティビックス<br>イリノテカン                    | 6 mg/kg<br>150 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴<br>点滴             | 1<br>1                           |
| 【大腸】Cmab                                 | 7日      | PDまで            | アービタックス                               | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                   | 1<br>初回：400mg/m <sup>2</sup>     |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                                 | 1コースの日数 | 予定コース数 | 使用抗がん薬   | 投与量                    | 投与方法 | 投与日                       |
|---------------------------------------|---------|--------|----------|------------------------|------|---------------------------|
| 【大腸】Pmab                              | 14日     | PDまで   | ベクティビックス | 6 mg/kg                | 点滴   | 1                         |
| 【大腸】5FU肝動注                            | 7日      | PDまで   | 5-FU     | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 動注   | 1                         |
| 【大腸】mUFT/UZEL+BV                      | 21日     | PDまで   | アバステチン   | 7.5 mg/kg              | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | ユーエフティー  | 300 mg/m <sup>2</sup>  | 経口   | 1-14                      |
|                                       |         |        | ユーゼル     | 75 mg/body             | 経口   | 1-14                      |
| 【大腸】mS-1+BV                           | 21日     | PDまで   | アバステチン   | 7.5 mg/kg              | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | ティーエスワン  | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-14 分2                   |
| 【大腸】Cape+BV                           | 21日     | PDまで   | アバステチン   | 7.5 mg/kg              | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | ゼローダ     | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 経口   | 1-14 分2                   |
| 【大腸】FOLFOXIRI(CPT-11+LV+L-OHP+5FU)+BV | 14日     | 12コース  | アバステチン   | 5 mg/kg                | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | イリノテカン   | 165 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | レボホリナート  | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | エルプラット   | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | 5-FU     | 3200 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1~ civ                    |
| 【大腸】FOLFIRI(LV+CPT-11+5FU)+RAM        | 14日     | PDまで   | サイラムザ    | 8 mg/kg                | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | レボホリナート  | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | イリノテカン   | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | 5-FU     | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1 bolus                   |
|                                       |         |        |          | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1~ civ                    |
| 【大腸】FOLFIRI(LV+CPT-11+5FU)+AFLI       | 14日     | PDまで   | ザルトラップ   | 4 mg/kg                | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | レボホリナート  | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | イリノテカン   | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | 5-FU     | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1 bolus                   |
|                                       |         |        |          | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1~ civ                    |
| 【大腸】mXELIRI (Cape+CPT-11)             | 21日     | PDまで   | ゼローダ     | 1600 mg/m <sup>2</sup> | 経口   | 1-14 分2                   |
|                                       |         |        | イリノテカン   | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                         |
| 【大腸】mXELIRI (Cape+CPT-11)+BV          | 21日     | PDまで   | ゼローダ     | 1600 mg/m <sup>2</sup> | 経口   | 1-14 分2                   |
|                                       |         |        | アバステチン   | 7.5 mg/kg              | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | イリノテカン   | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                         |
| 【大腸】TAS102+BV                         | 28日     | PDまで   | ロンサーフ    | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-5, 8-12 分2朝夕食後          |
|                                       |         |        | アバステチン   | 5 mg/kg                | 点滴   | 1,15                      |
| 【大腸】encorafenib+binimetinib+Cmab      | 7日      | PDまで   | ビラフトビ    | 300 mg/body            | 経口   | 1-7 分1                    |
|                                       |         |        | メクトビ     | 45 mg/body             | 経口   | 1-7 分2                    |
|                                       |         |        | アービタックス  | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1 初回：400mg/m <sup>2</sup> |
| 【大腸】encorafenib+Cmab                  | 7日      | PDまで   | ビラフトビ    | 300 mg/body            | 経口   | 1-7 分1                    |
|                                       |         |        | アービタックス  | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1 初回：400mg/m <sup>2</sup> |
| 【大腸】pertuzumab+Tmab                   | 21日     | PDまで   | パージェタ    | 840 mg/body            | 点滴   | 1 初回                      |
|                                       |         |        |          | 420 mg/body            | 点滴   | 1 2回目以降                   |
|                                       |         |        | ハーセプチン   | 8 mg/kg                | 点滴   | 1 初回                      |
|                                       |         |        |          | 6 mg/kg                | 点滴   | 1 2回目以降                   |
| <b>神経内分泌腫瘍</b>                        |         |        |          |                        |      |                           |
| 【NET】STZ                              | 42日     | PDまで   | ザノサー     | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8,15,22,29,36           |
| 【NEC】VP-16+CDDP                       | 21日     | 4コース   | エトポシド    | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-3                       |
|                                       |         |        | シスプラチン   | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                         |
| 【NEC】CPT-11+CDDP                      | 28日     | 4コース   | イリノテカン   | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,8,15                    |
|                                       |         |        | シスプラチン   | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                         |
| 【NEC】VP-16+CBDCA                      | 21日     | 4コース   | エトポシド    | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-3                       |
|                                       |         |        | カルボプラチン  | 5 AUC                  | 点滴   | 1                         |
| 【PPGL】CVD (VCR+CPA+DTIC)              | 21日     | PDまで   | オンコピン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1 最大2mg/body              |
|                                       |         |        | エンドキサン   | 750 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                         |
|                                       |         |        | ダカルバジン   | 600 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,2                       |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注)臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                    | 1コースの日数 | 予定コース数               | 使用抗がん薬   | 投与量                    | 投与方法 | 投与日              |                                 |
|--------------------------|---------|----------------------|----------|------------------------|------|------------------|---------------------------------|
| <b>肝</b>                 |         |                      |          |                        |      |                  |                                 |
| 【肝】LFP肝動注(導入)            | 42日     | PDまで                 | シスプラチン   | 10 mg/body             | 動注   | 1-5              |                                 |
|                          |         |                      | 5-FU     | 1250 mg/body           | 動注   | 1,8,15,22        |                                 |
|                          |         |                      | シスプラチン   | 5 mg/body              | 動注   | 8,10,15,17,22,24 |                                 |
| 【肝】LFP肝動注(維持)            | 42日     | PDまで                 | シスプラチン   | 10 mg/body             | 動注   | 1,8,15,22        |                                 |
|                          |         |                      | 5-FU     | 750 mg/body            | 動注   | 1,8,15,22        |                                 |
| 【肝】FEM (肝動注EPI+MMC+5-FU) | 28日     |                      | エピルビシン   | 40 mg/body             | 動注   | 1                |                                 |
|                          |         |                      | マイトマイシンC | 4 mg/body              | 動注   | 1,15             |                                 |
|                          |         |                      | 5-FU     | 500 mg/body            | 動注   | 1,8,15,22        |                                 |
| 【肝】RAM                   | 14日     | PDまで                 | サイラムザ    | 8 mg/kg                | 点滴   | 1                |                                 |
| 【肝】New-LFP肝動注            | 14日     | 導入1コース→<br>維持PDまで    | シスプラチン   | 50 mg/body             | 動注   | 1,8              | 導入                              |
|                          |         |                      | 5-FU     | 250 mg/body            | 動注   | 1,8              | 導入                              |
|                          |         |                      |          | 1250 mg/body           | 動注   | 1,8              | 導入                              |
|                          |         |                      | シスプラチン   | 20 mg/body             | 動注   | 1                | 維持                              |
|                          |         |                      | 5-FU     | 250 mg/body            | 動注   | 1                | 維持                              |
|                          |         |                      |          | 1250 mg/body           | 動注   | 1                | 維持                              |
| 【肝】Atezo+BV              | 21日     | PDまで                 | テセントリク   | 1200 mg/body           | 点滴   | 1                |                                 |
|                          |         |                      | アバスタチン   | 15 mg/kg               | 点滴   | 1                |                                 |
| 【肝】Durva                 | 28日     | PDまで                 | イミフィンジ   | 1500 mg/body           | 点滴   | 1                | 体重30kg以下の場合<br>は20mg/kg         |
| 【肝】Treme+Durva           | 28日     | PDまで                 | イジユド     | 300 mg/body            | 点滴   | 1                | 1コース目のみ、体<br>重30kg以下は<br>4mg/kg |
|                          |         |                      | イミフィンジ   | 1500 mg/body           | 点滴   | 1                | 体重30kg以下は<br>20mg/kg            |
| <b>胆道</b>                |         |                      |          |                        |      |                  |                                 |
| 【胆】GEM                   | 28日     | PDまで                 | ゲムシタピン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8,15           |                                 |
| 【胆】S-1+GEM               | 21日     | PDまで                 | ティーエスワン  | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-14             | 分2                              |
|                          |         |                      | ゲムシタピン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8              |                                 |
| 【胆】CDDP+GEM              | 21日     | PDまで(原則、<br>最大16回まで) | シスプラチン   | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,8              |                                 |
|                          |         |                      | ゲムシタピン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8              |                                 |
| 【胆】S-1+CDDP+GEM          | 14日     | (臨床試験では<br>計12コース)   | ティーエスワン  | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-7              |                                 |
|                          |         |                      | シスプラチン   | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                |                                 |
|                          |         |                      | ゲムシタピン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1                |                                 |
| 【胆】Durva+CDDP+GEM        | 21日     | 最大8コース               | イミフィンジ   | 1500 mg/body           | 点滴   | 1                | 体重30kg以下の場合<br>は20mg/kg         |
|                          |         |                      | シスプラチン   | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,8              |                                 |
|                          |         |                      | ゲムシタピン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8              |                                 |
| 【胆】Durva維持               | 28日     | PDまで                 | イミフィンジ   | 1500 mg/body           | 点滴   | 1                | 体重30kg以下の場合<br>は20mg/kg         |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                                     | 1コースの日数 | 予定コース数               | 使用抗がん薬  | 投与量                    | 投与方法 | 投与日          |
|---|---------|----------------------|---------|------------------------|------|--------------|
| <b>【麟】</b> GEM                            | 28日     | PDまで                 | ゲムシタビン  | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8,15       |
| <b>【麟】</b> S-1+GEM                        | 21日     | PDまで                 | ティーエスワン | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-14 分2      |
|   |         |                      | ゲムシタビン  | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8          |
| <b>【麟】</b> FOLFIRINOX (アロカリスver)          | 14日     | PDまで                 | エルプラット  | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | レボホリナート | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | イリノテカン  | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | 5-FU    | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1 bolus      |
|   |         |                      |         | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1~           |
| <b>【麟】</b> FOLFIRINOX                     | 14日     | PDまで                 | エルプラット  | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | レボホリナート | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | イリノテカン  | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | 5-FU    | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1 bolus      |
|   |         |                      |         | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1~           |
| <b>【麟】</b> modified FOLFIRINOX (アロカリスver) | 14日     | PDまで (術後は12コース)      | エルプラット  | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | レボホリナート | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | イリノテカン  | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | 5-FU    | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1~           |
| <b>【麟】</b> modified FOLFIRINOX            | 14日     | PDまで (術後は12コース)      | エルプラット  | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | レボホリナート | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | イリノテカン  | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | 5-FU    | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1~           |
| <b>【麟】</b> SOXIRI                         | 14日     |                      | ティーエスワン | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 隔日 日・月・水・金服用 |
|   |         |                      | エルプラット  | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | イリノテカン  | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1            |
| <b>【麟】</b> SOXIRI (アロカリスver)              | 14日     |                      | ティーエスワン | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 隔日 日・月・水・金服用 |
|   |         |                      | エルプラット  | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | イリノテカン  | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1            |
| <b>【麟】</b> nab-PTX+GEM                    | 28日     | PDまで                 | アブラキサン  | 125 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15       |
|   |         |                      | ゲムシタビン  | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8,15       |
| <b>【麟】</b> nab-PTX+GEM (アロカリスver)         | 28日     | PDまで                 | アブラキサン  | 125 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15       |
|   |         |                      | ゲムシタビン  | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8,15       |
| <b>【麟】</b> DCS (S-1+CDDP+DOC)             | 14日     | PDまで                 | ティーエスワン | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-7          |
|   |         |                      | シスプラチン  | 13 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | ドセタキセル  | 27 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1            |
| <b>【麟】</b> RT+GEM                         | 35日     | 1コース                 | ゲムシタビン  | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8,15,22,29 |
| <b>【麟】</b> Erlotinib+GEM                  | 28日     | PDまで                 | タルセバ    | 100 mg/body            | 経口   | 1-28         |
|   |         |                      | ゲムシタビン  | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8,15       |
| <b>【麟】</b> GEM+WHF (肝動注)                  | 28日     | 6コース (肝動注は最初の3コースのみ) | ゲムシタビン  | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8,15       |
|   |         |                      | 5-FU    | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8,15       |
| <b>【麟】</b> low dose 5-FU麟動注               | 7日      | 5コース                 | 5-FU    | 2500 mg/body           | 動注   | 1 SVIにて5日間投与 |
| <b>【麟】</b> nal-IRI+LV+5-FU (アロカリスver)     | 14日     | PDまで                 | オニバイド   | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | レボホリナート | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | 5-FU    | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1~           |
| <b>【麟】</b> nal-IRI+LV+5-FU                | 14日     | PDまで                 | オニバイド   | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | レボホリナート | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1            |
|   |         |                      | 5-FU    | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1~           |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
 注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                                   | 1コースの日数 | 予定コース数  | 使用抗がん薬   | 投与量                    | 投与方法 | 投与日     |                     |
|---|---------|---|----------|------------------------|------|---------|---------------------|
| <b>腎</b>                                |         |   |          |                        |      |         |                     |
| 【腎】IL-2(導入)                             | 7日      |   | イムネース    | 70万 U/body             | 点滴   | 1-5     | 70-210万単位 (原則70万単位) |
| 【腎】IL-2(維持)                             | 7日      | 3コース  | イムネース    | 70万 U/body             | 点滴   | 1       | 70-210万単位           |
| 【腎】Nivo                                 | 日       | PDまで  | オブジーボ    | 240 mg/body            | 点滴   | 1       | q2w                 |
|   |         |   |          | 480 mg/body            | 点滴   | 1       | q4w                 |
| 【腎】Nivo+Ipi (Ipi ≤ 120mg)               | 21日     | 4コース→Nivo単剤へ                                      | オブジーボ    | 240 mg/body            | 点滴   | 1       |                     |
|   |         |   | ヤーボイ     | 1 mg/kg                | 点滴   | 1       |                     |
| 【腎】Temsirrolimus                        | 7日      | PDまで  | トリーセル    | 25 mg/body             | 点滴   | 1       |                     |
| 【腎】Axitinib+Pembro                      | 21日     | PDまで  | インライタ    | 10 mg/body             | 経口   | 連日      | 分2、1回10mg1日2回まで増量可  |
|   |         |   | キイトルーダ   | 200 mg/body            | 点滴   | 1       | q3w                 |
|   |         |   |          | 400 mg/body            | 点滴   | 1       | q6w                 |
| 【腎】Axitinib+Avelu                       | 14日     | PDまで  | バベンチオ    | 10 mg/kg               | 点滴   | 1       |                     |
|   |         |   | インライタ    | 10 mg/body             | 経口   | 1-14    | 分2、1回10mg1日2回まで増量可  |
| 【腎】CABO+Nivo                            | 日       | PDまで  | オブジーボ    | 240 mg/body            | 点滴   | 1       | q2w                 |
|   |         |   |          | 480 mg/body            | 点滴   | 1       | q4w                 |
|   |         |   | カボメティクス  | 40 mg/body             | 経口   | 連日      | 1日1回空腹時             |
| 【腎】Pembro+レンパチニブ                        | 日       | PDまで  | キイトルーダ   | 200 mg/body            | 点滴   | 1       | 3週1コース              |
|   |         |   |          | 400 mg/body            | 点滴   | 1       | 6週1コース              |
|   |         |   | レンピマ     | 20 mg/body             | 経口   | 連日      | 適宜減量                |
| 【腎】術後Pembro                             | 日       | PDまで(最大17コース or 1年間)                              | キイトルーダ   | 200 mg/body            | 点滴   | 1       | 3週1コース              |
|   |         |   |          | 400 mg/body            | 点滴   | 1       | 6週1コース              |
| <b>膀胱尿路上皮</b>                           |         |   |          |                        |      |         |                     |
| 【膀胱尿路】MVAC(MTX+VBL+DXR+CDDP)            | 28日     | PDまで(術前は3コース)                                     | メソトレキセート | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,15,22 |                     |
|   |         |   | エクザール    | 3 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 2,15,22 |                     |
|   |         |   | ドキソルビシン  | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 2       |                     |
|   |         |   | シスプラチン   | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 2       |                     |
| 【膀胱尿路】GEM+CDDP_アロリスver                  | 28日     | PDまで  | ゲムシタピン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8,15  |                     |
|   |         |   | シスプラチン   | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 2       |                     |
| 【膀胱尿路】GEM+CDDP (プロイメントver)              | 28日     | PDまで  | ゲムシタピン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8,15  |                     |
|   |         |   | シスプラチン   | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 2       |                     |
| 【膀胱尿路】GEM+CDDP                          | 28日     | PDまで  | ゲムシタピン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8,15  |                     |
|   |         |   | シスプラチン   | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 2       |                     |
| 【膀胱尿路】GEM+CBDCA(アロリスver)                | 21日     | PDまで  | ゲムシタピン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8     |                     |
|   |         |   | カルボプラチン  | 5 AUC                  | 点滴   | 1       |                     |
| 【膀胱尿路】GEM+CBDCA                         | 21日     | PDまで  | ゲムシタピン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8     |                     |
|   |         |   | カルボプラチン  | 5 AUC                  | 点滴   | 1       |                     |
| 【膀胱尿路】PTX+GEM                           | 21日     | PDまで  | パクリタキセル  | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1       |                     |
|   |         |   | ゲムシタピン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8     |                     |
| 【膀胱尿路】PTX+NDP                           | 21日     |   | パクリタキセル  | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1       |                     |
|   |         |   | アクブラ     | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1       |                     |
| 【膀胱尿路】dd-MVAC(MTX+VBL+DXR+CDDP)         | 14日     | PDまで(術前は4コース目標)                                   | メソトレキセート | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1       |                     |
|   |         |   | エクザール    | 3 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 2       |                     |
|   |         |   | ドキソルビシン  | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 2       |                     |
|   |         |   | シスプラチン   | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 2       |                     |
| 【膀胱尿路】dd-MVAC(MTX+VBL+DXR+CDDP)_アロリスver | 14日     | PDまで(術前は4コース目標)                                   | メソトレキセート | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1       |                     |
|   |         |   | エクザール    | 3 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 2       |                     |
|   |         |   | ドキソルビシン  | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 2       |                     |
|   |         |   | シスプラチン   | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 2       |                     |
| 【膀胱】THP膀胱注                              | 7日      |   | テラルビシン   | 30 mg/body             | 膀胱注  | 1       |                     |
| 【膀胱】EPI膀胱注                              | 7日      |   | エビルビシン   | 60 mg/body             | 膀胱注  | 1       |                     |
| 【膀胱尿路】Pembro                            | 日       | PDまで  | キイトルーダ   | 200 mg/body            | 点滴   | 1       | q3w                 |
|   |         |   |          | 400 mg/body            | 点滴   | 1       | q6w                 |
| 【膀胱】RT+low dose GEM                     | 7日      | (weeks 1-4) 4コース施行→(weeks 8-10) day1,4,8,11,15に投与 | ゲムシタピン   | 27 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,4     |                     |
| 【膀胱尿路】Avelu                             | 14日     | PDまで  | バベンチオ    | 10 mg/kg               | 点滴   | 1       |                     |
| 【膀胱尿路】Padcev                            | 28日     | PDまで  | パドセブ     | 1.25 mg/kg             | 点滴   | 1,8,15  | 1回量として125mgを超えないこと  |
| 【膀胱尿路】術後Nivo                            | 日       | 12ヶ月間   | オブジーボ    | 240 mg/body            | 点滴   | 1       | 2週1コース              |
|   |         |   |          | 480 mg/body            | 点滴   | 1       | 4週1コース              |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名                                | 1コースの日数 | 予定コース数                     | 使用抗がん薬                                 | 投与量  | 投与方法                 | 投与日                                    |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|--|--|----------------------|--|
| <b>前立腺</b>                           |         |                            |  |  |                      |  |
| 【前立腺】PSL+DOC                         | 21日     | 10コース                      | ドセタキセル<br>プレドニン                        | 75 mg/m <sup>2</sup><br>10 mg/body   | 点滴<br>経口             | 1<br>1-21                              |
| 【前立腺】DEX+DOC                         | 21日     | 10コース                      | ドセタキセル<br>デカドロン                        | 75 mg/m <sup>2</sup><br>1 mg/body  | 点滴<br>経口             | 1<br>1-21 分2                           |
| 【前立腺】PSL+CTX                         | 21日     | PDまで                       | ジェブタナ<br>プレドニン                         | 25 mg/m <sup>2</sup><br>10 mg/body   | 点滴<br>経口             | 1<br>1-21 分2                           |
| 【前立腺】ADT+DARO+PSL+DOC                | 21日     | 6コース→<br>ADT+DAROの<br>維持療法 | ドセタキセル<br>ニューベクオ<br>プレドニン              | 75 mg/m <sup>2</sup><br>1200 mg/body<br>10 mg/body   | 点滴<br>経口<br>経口       | 1<br>1-21<br>1-21 1回600mg、1日2回<br>(食後) |
| <b>泌尿器他</b>                          |         |                            |  |  |                      |  |
| 【陰莖】TIP (PTX+IFM+CDDP)               | 21日     | PDまで(術前4<br>コース)           | バクリタキセル<br>イホマイド<br>シスプラチン             | 175 mg/m <sup>2</sup><br>1200 mg/m <sup>2</sup><br>25 mg/m <sup>2</sup>                          | 点滴<br>点滴<br>点滴       | 1<br>1-3<br>1-3                        |
| 【副腎】Mitotane+EDP(DXR+VP-<br>16+CDDP) | 28日     | PDまで(DXRの<br>総投与量注意)       | オペプリム<br>ドキシソピシン<br>エトボシド<br>シスプラチン    | 1500 mg/body<br>40 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup><br>40 mg/m <sup>2</sup>            | 経口<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1-28 分3<br>1<br>2-4<br>3,4             |
| <b>胚細胞</b>                           |         |                            |  |  |                      |  |
| 【胚細胞】BEP (VP-16+CDDP+BLM)            | 21日     | 2~4コース                     | エトボシド<br>シスプラチン<br>ブレオ                 | 100 mg/m <sup>2</sup><br>20 mg/m <sup>2</sup><br>30 mg/body                                      | 点滴<br>点滴<br>点滴       | 1-5<br>1-5<br>1,8,15                   |
| 【胚細胞】EP (VP-16+CDDP)                 | 21日     | 3コース(4コース<br>の場合もあり)       | エトボシド<br>シスプラチン                        | 100 mg/m <sup>2</sup><br>20 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴<br>点滴             | 1-5<br>1-5                             |
| 【胚細胞】TIP (PTX+IFM+CDDP)              | 21日     | PDまで                       | バクリタキセル<br>イホマイド<br>シスプラチン<br>※ウロミテキサン | 175 mg/m <sup>2</sup><br>1200 mg/m <sup>2</sup><br>20 mg/m <sup>2</sup><br>240 mg/m <sup>2</sup> | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1-5<br>1-5<br>1-5 1回量             |
| 【胚細胞】VIP (VP-16+IFM+CDDP)            | 21日     | 4コース                       | エトボシド<br>イホマイド<br>シスプラチン<br>※ウロミテキサン   | 75 mg/m <sup>2</sup><br>1200 mg/m <sup>2</sup><br>20 mg/m <sup>2</sup><br>240 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴 | 1-5<br>1-5<br>1-5<br>1-5 1回量           |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません



| レジメン名                    | 1コースの日数 | 予定コース数                | 使用抗がん薬    | 投与量                    | 投与方法 | 投与日    |   |
|--------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|------|--------|---|
| <b>子宮頸</b>               |         |                       |           |                        |      |        |   |
| 【子宮頸】PTX+CDDP            | 21日     | 6コース                  | パクリタキセル   | 135 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1      | (45mg/m <sup>2</sup> +90mg/m <sup>2</sup> ) |
|                          |         |                       | シスプラチン    | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 2      |   |
| 【子宮頸】NGT+CDDP            | 21日     | PDまで                  | ハイカムチン    | 0.75 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,2,3  |   |
|                          |         |                       | シスプラチン    | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮頸】DOC+CBDCA           | 21日     | 6コース                  | ドセタキセル    | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | カルボプラチン   | 5 AUC                  | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮頸】CPT-11+CDDP         | 28日     | 6コース                  | イリノテカン    | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,8,15 |   |
|                          |         |                       | シスプラチン    | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮頸】RT+weeklyCDDP       | 7日      | 6コース                  | シスプラチン    | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮頸】RT+5-FU+CDDP        | 28日     | 4コース                  | シスプラチン    | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | 5-FU      | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-4    |   |
| 【子宮頸】NDP                 | 28日     | 6コース                  | アクプラ      | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮頸】CPT-11              | 28日     | 6コース                  | イリノテカン    | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15 |   |
| 【子宮頸】BV+PTX+CDDP         | 21日     | 6コース                  | アバスチン     | 15 mg/kg               | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | パクリタキセル   | 135 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1      | (45mg/m <sup>2</sup> +90mg/m <sup>2</sup> ) |
|                          |         |                       | シスプラチン    | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 2      |   |
| 【子宮頸】PTX+CBDCA+BV        | 21日     | 6コース                  | パクリタキセル   | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | カルボプラチン   | 5 AUC                  | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | アバスチン     | 15 mg/kg               | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮頸】CPT-11+CDDP+BV      | 28日     | 6コース                  | イリノテカン    | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,8,15 |   |
|                          |         |                       | シスプラチン    | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | アバスチン     | 15 mg/kg               | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮毛頸】RT+PTX+CBDCA       | 7日      | (術後)6コース、<br>(進行)5コース | パクリタキセル   | 35 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | カルボプラチン   | 2 AUC                  | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮頸】Pembro+PTX+CDDP     | 21日     | 6コース                  | キイトルーダ    | 200 mg/body            | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | パクリタキセル   | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | シスプラチン    | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮頸】Pembro+PTX+CDDP+BV  | 21日     | 6コース                  | キイトルーダ    | 200 mg/body            | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | パクリタキセル   | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | シスプラチン    | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | アバスチン     | 15 mg/kg               | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮頸】Pembro+PTX+CBDCA    | 21日     | 6コース                  | パクリタキセル   | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | カルボプラチン   | 5 AUC                  | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | キイトルーダ    | 200 mg/body            | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮頸】Pembro+PTX+CBDCA+BV | 21日     | 6コース                  | パクリタキセル   | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | カルボプラチン   | 5 AUC                  | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | キイトルーダ    | 200 mg/body            | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | アバスチン     | 15 mg/kg               | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮頸】Pembro維持            | 21日     | PDまで                  | キイトルーダ    | 200 mg/body            | 点滴   | 1      | q3w   |
|                          |         |                       |           | 400 mg/body            | 点滴   | 1      | q6w   |
| 【子宮頸】BV+Pembro維持         | 21日     | PDまで                  | キイトルーダ    | 200 mg/body            | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | アバスチン     | 15 mg/kg               | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮頸】Gemip               | 21日     | PDまで                  | リブタヨ      | 350 mg/body            | 点滴   | 1      |   |
| <b>子宮体</b>               |         |                       |           |                        |      |        |   |
| 【子宮体】PTX+CBDCA           | 21日     | PDまで                  | パクリタキセル   | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | カルボプラチン   | 5 AUC                  | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮体】PTX+CBDCA(アロカスver)  | 21日     | PDまで                  | パクリタキセル   | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | カルボプラチン   | 5 AUC                  | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮体】DOC+CBDCA           | 21日     | PDまで                  | ドセタキセル    | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | カルボプラチン   | 5 AUC                  | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮体】DXR+CDDP            | 21日     | 8コース                  | ドキシソルピシン  | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1      |   |
|                          |         |                       | シスプラチン    | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1      |   |
| 【子宮体】weeklyPTX           | 21日     | PDまで                  | パクリタキセル   | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,8,15 |   |
| 【子宮体】DXR                 | 21日     | 8コース(DXRの<br>総投与量より)  | ドキシソルピシン  | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1      | 総投与量は480mg/m <sup>2</sup> まで                |
| 【子宮癌肉腫】IFM+CDDP          | 21日     | 8コース(術後は<br>3~6コース)   | イホマイド     | 1500 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1-4    |   |
|                          |         |                       | シスプラチン    | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-4    |   |
|                          |         |                       | (ウロミテキサン) | 900 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-4    | 1回300mg/m <sup>2</sup> ×3回                  |
| 【子宮体癌】Pembro+レンパチニブ      | 日       | PDまで                  | キイトルーダ    | 200 mg/body            | 点滴   | 1      | 3週1回  |
|                          |         |                       | レンピマ      | 20 mg/body             | 経口   | 連日(分1) | 適宜減量  |
|                          |         |                       | キイトルーダ    | 400 mg/body            | 点滴   | 1      | 6週1回  |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注)臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名   | 1コースの日数 | 予定コース数                            | 使用抗がん薬  | 投与量   | 投与方法                             | 投与日                             |                              |
|---|---------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>卵巣</b>   |         |                                   |   |   |                                  |                                 |                              |
| 【卵巣】PTX+CBDCA                                     | 21日     | 6コース                              | パクリタキセル<br>カルボプラチン                                      | 175 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC  | 点滴<br>点滴                         | 1<br>1                          |                              |
| 【卵巣】PTX+CBDCA(7回リsver)                            | 21日     | 6コース                              | パクリタキセル<br>カルボプラチン                                      | 175 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC  | 点滴<br>点滴                         | 1<br>1                          |                              |
| 【卵巣】dose-dense PTX+CBDCA                          | 21日     | 6コース                              | パクリタキセル<br>カルボプラチン                                      | 80 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC   | 点滴<br>点滴                         | 1,8,15<br>1                     |                              |
| 【卵巣】PTX+CBDCA+BV                                  | 21日     | 6コース                              | パクリタキセル<br>カルボプラチン<br>アバスタチン                            | 175 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC<br>15 mg/kg  | 点滴<br>点滴<br>点滴                   | 1<br>1<br>1                     |                              |
| 【卵巣】dose-dense PTX+CBDCA+BV                       | 21日     | 6コース                              | パクリタキセル<br>カルボプラチン<br>アバスタチン                            | 80 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC<br>15 mg/kg   | 点滴<br>点滴<br>点滴                   | 1,8,15<br>1<br>1                |                              |
| 【卵巣】DOC+CBDCA                                     | 21日     | 6コース                              | ドセタキセル<br>カルボプラチン                                       | 70 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC   | 点滴<br>点滴                         | 1<br>1                          |                              |
| 【卵巣】DOC+CBDCA+BV                                  | 21日     | 6コース                              | ドセタキセル<br>カルボプラチン<br>アバスタチン                             | 70 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC<br>15 mg/kg   | 点滴<br>点滴<br>点滴                   | 1<br>1<br>1                     |                              |
| 【卵巣】GEM+CBDCA                                     | 21日     | 6コース(効果あれば最大10コース可能)              | ゲムシタビン<br>カルボプラチン                                       | 1000 mg/m <sup>2</sup><br>4 AUC   | 点滴<br>点滴                         | 1,8<br>1                        |                              |
| 【卵巣】GEM+CBDCA+BV                                  | 21日     | 6コース(効果あれば最大10コース可能)、BVはPDまで可能    | ゲムシタビン<br>カルボプラチン<br>アバスタチン                             | 1000 mg/m <sup>2</sup><br>4 AUC<br>15 mg/kg   | 点滴<br>点滴<br>点滴                   | 1,8<br>1<br>1                   |                              |
| 【卵巣】CPT-11+CDDP                                   | 28日     | 6コース                              | イリノテカン<br>シスプラチン  | 60 mg/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴<br>点滴                         | 1,8,15<br>1                     |                              |
| 【卵巣】ドキシル  | 28日     | PDまで                              | ドキシル  | 50 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                               | 1                               | 総投与量500mg/m <sup>2</sup> まで  |
| 【卵巣】ドキシル+BV                                       | 28日     | PDまで                              | ドキシル<br>アバスタチン  | 50 mg/m <sup>2</sup><br>15 mg/kg  | 点滴<br>点滴                         | 1<br>1                          | 総投与量500mg/m <sup>2</sup> まで  |
| 【卵巣】GEM   | 28日     | PDまで                              | ゲムシタビン  | 1000 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                               | 1,8,15                          |                              |
| 【卵巣】GEM+BV  | 28日     | PDまで                              | ゲムシタビン<br>アバスタチン  | 1000 mg/m <sup>2</sup><br>15 mg/kg  | 点滴<br>点滴                         | 1,8,15<br>1                     |                              |
| 【卵巣】NGT   | 21日     | PDまで                              | ハイカムチン  | 1.25 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                               | 1-5                             |                              |
| 【卵巣】CPT-11  | 28日     | 6コース                              | イリノテカン  | 100 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                               | 1,8,15                          |                              |
| 【卵巣】CPT-11+BV                                     | 28日     | 6コース                              | イリノテカン<br>アバスタチン  | 100 mg/m <sup>2</sup><br>15 mg/kg   | 点滴<br>点滴                         | 1,8,15<br>1                     |                              |
| 【卵巣】weeklyPTX                                     | 21日     | PDまで                              | パクリタキセル   | 80 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                               | 1,8,15                          |                              |
| 【卵巣】weeklyPTX+BV                                  | 21日     | PDまで                              | パクリタキセル<br>アバスタチン                                       | 80 mg/m <sup>2</sup><br>15 mg/kg  | 点滴<br>点滴                         | 1,8,15<br>1                     |                              |
| 【卵巣】BV  | 21日     | PDまで                              | アバスタチン  | 15 mg/kg  | 点滴                               | 1                               |                              |
| 【卵巣】weeklyPTX+weeklyCBDCA                         | 21日     | 6コース                              | パクリタキセル<br>カルボプラチン                                      | 60 mg/m <sup>2</sup><br>2 AUC   | 点滴<br>点滴                         | 1,8,15<br>1,8,15                |                              |
| 【卵巣】Olaparib+BV維持                                 | 21日     | アバスタチン:最長15ヶ月(22コース) リムパーザ:最長24ヶ月 | アバスタチン<br>リムパーザ   | 15 mg/kg<br>600 mg/body   | 点滴<br>経口                         | 1<br>1-21                       | 分2                           |
| <b>婦人科他</b>                                       |         |                                   |   |   |                                  |                                 |                              |
| 【子宮平滑筋肉腫】DXR                                      | 21日     | 8コース(DXRの総投与量より)                  | ドキシソルビシン  | 60 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                               | 1                               | 総投与量は480mg/m <sup>2</sup> まで |
| 【子宮平滑筋肉腫】GEM+DOC                                  | 21日     | PDまで                              | ゲムシタビン<br>ドセタキセル  | 800 mg/m <sup>2</sup><br>70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴<br>点滴                         | 1,8<br>8                        |                              |
| 【絨毛】EMA/CO (VP-16+MTX+ACT-D/CPA+VCR)(ロイコボリン内服ver) | 14日     | hCG正常範囲内に下降後、4コース追加               | メソトレキセート<br>エトポシド<br>コスメゲン<br>ロイコボリン<br>エンドキサン<br>オンコピン | 300 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup><br>0.5 mg/body<br>15 mg/body<br>600 mg/m <sup>2</sup><br>0.8 mg/m <sup>2</sup> | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>経口<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1,2<br>1,2<br>2~<br>8<br>8 | 12時間毎に4回<br>最大2mg/body       |
| 【絨毛】EMA/CO (VP-16+MTX+ACT-D/CPA+VCR)              | 14日     | hCG正常範囲内に下降後、4コース追加               | メソトレキセート<br>エトポシド<br>コスメゲン<br>ロイコボリン<br>エンドキサン<br>オンコピン | 300 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup><br>0.5 mg/body<br>15 mg/body<br>600 mg/m <sup>2</sup><br>0.8 mg/m <sup>2</sup> | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>筋注<br>点滴<br>点滴 | 1<br>1,2<br>1,2<br>2~<br>8<br>8 | 12時間毎に4回<br>最大2mg/body       |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名  | 1コースの日数 | 予定コース数                                   | 使用抗がん薬   | 投与量                     | 投与方法 | 投与日                             |
|--|---------|--|----------|-------------------------|------|---------------------------------|
| <b>骨軟部肉腫</b>                                   |         |  |          |                         |      |                                 |
| 【骨肉腫】CDDP+DXR (24時間ver、civ)                    | 21日     |  | シスプラチン   | 120 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1<br>30歳以上は100mg/m <sup>2</sup> |
|  |         |  | ドキシソルピシン | 30 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1,2                             |
| 【骨肉腫】CDDP+DXR (iv)                             | 21日     |  | シスプラチン   | 120 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1<br>30歳以上は100mg/m <sup>2</sup> |
|  |         |  | ドキシソルピシン | 30 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1,2                             |
| 【骨肉腫】HD-MTX                                    | 7日      |  | メソトレキセート | 12000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1                               |
| 【骨肉腫】VP-16+IFM                                 | 21日     |  | エトポシド    | 100 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-5                             |
|  |         |  | イホマイド    | 2000 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5                             |
|  |         |  | ※ウロミテキサン | 1200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5<br>1回400mg/m <sup>2</sup>   |
| 【骨肉腫】DXR (2時間ver)                              | 21日     | PDまで(最大6コース)                             | ドキシソルピシン | 30 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1-3                             |
| 【骨肉腫】DXR (24時間ver)                             | 21日     | PDまで(最大6コース)                             | ドキシソルピシン | 30 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1-3                             |
| 【Ewing肉腫】VC (VCR+CPA)                          | 21日     | 2~4コース                                   | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1<br>最大2mg/body                 |
|  |         |  | エンドキサン   | 1200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                               |
|  |         |  | ※ウロミテキサン | 720 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1<br>1回240mg/m <sup>2</sup>     |
| 【Ewing肉腫】VDC (VCR+CPA+DXR)                     | 21日     | 5コース                                     | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1<br>最大2mg/body                 |
|  |         |  | エンドキサン   | 1200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                               |
|  |         |  | ドキシソルピシン | 37.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,2<br>5コースまで                   |
|  |         |  | ※ウロミテキサン | 720 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1<br>1回240mg/m <sup>2</sup>     |
| 【Ewing肉腫】IE (VP-16+IFM)                        | 21日     | 5コース                                     | エトポシド    | 100 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-5                             |
|  |         |  | イホマイド    | 1800 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5                             |
|  |         |  | ※ウロミテキサン | 1080 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5<br>1回360mg/m <sup>2</sup>   |
| 【軟部肉腫】IFM+DXR                                  | 21日     | 3コース                                     | イホマイド    | 2000 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5                             |
|  |         |  | ドキシソルピシン | 20 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1-3                             |
| 【軟部肉腫】DXR (75mg/m <sup>2</sup> /day)(アロカリスver) | 21日     | PDまで(最大6コース)                             | ドキシソルピシン | 75 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1                               |
| 【軟部肉腫】DXR (25mg/m <sup>2</sup> /day × 3)       | 21日     | PDまで(最大6コース)                             | ドキシソルピシン | 25 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1-3                             |
| 【軟部肉腫】DXR (75mg/m <sup>2</sup> /day)           | 21日     | PDまで(最大6コース)                             | ドキシソルピシン | 75 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1                               |
| 【軟部肉腫】eribulin                                 | 21日     | PDまで                                     | ハラヴェン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 1,8                             |
| 【軟部肉腫】Trabectedin                              | 21日     | PDまで                                     | ヨンデリス    | 1.2 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1                               |
| 【横紋筋肉腫】VAC (VCR+CPA+Act-D)                     | 21日     |  | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 1,8,15<br>最大2mg/body            |
|  |         |  | コスメゲン    | 0.015 mg/kg             | 静注   | 1-5<br>最大0.5mg/body             |
|  |         |  | ※ウロミテキサン | 450 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1<br>1回量                        |
|  |         |  | エンドキサン   | 2200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                               |
| 【平滑筋肉腫】GEM+DOC                                 | 21日     | 6コース?                                    | ゲムシタピン   | 1000 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8                             |
|  |         |  | ドセタキセル   | 35 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1,8                             |
| <b>皮膚</b>                                      |         |  |          |                         |      |                                 |
| 【悪性黒色腫】DTIC                                    | 28日     |  | ダカルバジン   | 800 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                               |
| 【悪性黒色腫】DAV/Feron (IFN-β+VCR+DTIC+ACNU)         | 28日     | I期:なし(あるいは1~2コース)、II期:2~4コース、III期:5~6コース | フェロン     | 300 万単位                 | 局注   | 1~5                             |
|  |         |  | オンコビン    | 0.8 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1                               |
|  |         |  | ダカルバジン   | 140 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1~5                             |
|  |         |  | ニドラン     | 80 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1                               |
| 【血管肉腫】weeklyPTX                                | 28日     | 6コース                                     | パクリタキセル  | 80 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1,8,15                          |
| 【血管肉腫】weeklyDOC                                | 28日     | PDまで                                     | ドセタキセル   | 25 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1,8,15                          |
| 【悪性黒色腫】Ipi (120mg<Ipi≤400mg)                   | 21日     | 4コース                                     | ヤーボイ     | 3 mg/kg                 | 点滴   | 1                               |
| 【悪性黒色腫】Nivo(q2w)                               | 日       | PDまで                                     | オブジーボ    | 240 mg/body             | 点滴   | 1<br>q2w                        |
|  |         |  |          | 480 mg/body             | 点滴   | 1<br>q4w                        |
| 【悪性黒色腫】Pembro                                  | 21日     | PDまで(術後は12カ月:計18コース)                     | キイトルーダ   | 200 mg/body             | 点滴   | 1<br>q3w                        |
|  |         |  |          | 400 mg/body             | 点滴   | 1<br>q6w                        |
| 【悪性黒色腫】Nivo+Ipi (120mg<Ipi≤400mg)              | 21日     | 4コース→5コース目からは、2週毎NivoをPDまで               | オブジーボ    | 80 mg/body              | 点滴   | 1                               |
|  |         |  | ヤーボイ     | 3 mg/kg                 | 点滴   | 1                               |
| 【有棘細胞】CPT-11                                   | 42日     | PDまで                                     | イリノテカン   | 100 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,8,15,22                       |
| 【乳房外Paget病】DOC                                 | 21日     | PDまで                                     | ドセタキセル   | 60 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1                               |
| 【メルケル細胞癌】Avelu                                 | 14日     | PDまで                                     | バベンチオ    | 10 mg/kg                | 点滴   | 1                               |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                       | 1コースの日数 | 予定コース数             | 使用抗がん薬    | 投与量                    | 投与方法 | 投与日  |  |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|------|------|--|
| <b>中枢神経系</b>                |         |                    |           |                        |      |      |  |
| 【神経膠腫】TMZ                   | 42日     | 6コース or PDまで       | テモダール     | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5  | 2コース目以降、200mg/m <sup>2</sup> まで増量可       |
| 【神経膠腫】RT+TMZ                | 42日     | 1コース→4週休薬後、TMZ維持療法 | テモダール     | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-42 |  |
| 【神経膠腫】2wBV±TMZ              | 14日     | TMZ24コースまで         | アバスタチン    | 10 mg/kg               | 点滴   | 1    | 42日間投与<br>1日1回連日5日間、<br>経口投与し、23日<br>間休薬 |
|                             |         |                    | (テモゾロミド)  | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-42 |  |
|                             |         |                    |           | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 経口   |      |  |
| 【神経膠腫】3wBV±TMZ              | 21日     | TMZ24コースまで         | アバスタチン    | 15 mg/kg               | 点滴   | 1    | 42日間投与<br>1日1回連日5日間、<br>経口投与し、23日<br>間休薬 |
|                             |         |                    | (テモゾロミド)  | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-42 |  |
|                             |         |                    |           | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 経口   |      |  |
| 【中枢原発リンパ腫】大量MTX             | 14日     | 原則3コース             | メソトレキセート  | 3500 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1    |  |
| 【神経膠腫】PCZ+ACNU+VCR (PAV)    | 42日     | 6コース               | ニドラン      | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 1    | 最大2mg/body                               |
|                             |         |                    | オンコピン     | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 静注   | 8,29 |  |
|                             |         |                    | 塩酸プロカルバジン | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 8-21 |  |
| 【脳胚細胞腫】ICE (IFM+CDDP+VP-16) | 28日     | 3~6コース             | イホマイド     | 900 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5  |  |
|                             |         |                    | シスプラチン    | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-5  |  |
|                             |         |                    | エトポシド     | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-5  |  |
| 【中枢原発リンパ腫】R-MPV             | 14日     | 5コース               | リツキサン     | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1    | 最大2.0mg/body<br>奇数コースのみ<br>服用            |
|                             |         |                    | メソトレキセート  | 3500 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 2    |  |
|                             |         |                    | オンコピン     | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 2    |  |
|                             |         |                    | プロカルバジン   | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 経口   | 2-8  |  |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名  | 1コースの日数 | 予定コース数            | 使用抗がん薬                                       | 投与量   | 投与方法                       | 投与日   |
|--|---------|-------------------|--|---|----------------------------|---|
| <b>白血病</b>   |         |                   |  |   |                            |   |
| 【AML】IDA+Ara-C   | 28日     | 1コース→寛解<br>なければ追加 | イダマイシン<br>キロサイド                              | 12 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴<br>点滴                   | 1-3<br>1-7  |
| 【AML】DNR+Ara-C   | 7日      | 1コース→寛解<br>なければ追加 | ダウノマイシン<br>キロサイド                             | 50 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴<br>点滴                   | 1-5<br>1-7  |
| 【AML】MIT+Ara-C (JALSGスタイル①<br>コース目)                                  | 7日      | 1コース              | ノバントロン<br>キロサイド                              | 7 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴<br>点滴                   | 1-3<br>1-5  |
| 【AML】DNR+Ara-C (JALSGスタイル②<br>コース目)                                  | 7日      | 1コース              | ダウノマイシン<br>キロサイド                             | 50 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴<br>点滴                   | 1-3<br>1-5  |
| 【AML】ACR+Ara-C (JALSGスタイル③<br>コース目)                                  | 7日      | 1コース              | アクラシン<br>キロサイド                               | 20 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴<br>点滴                   | 1-5<br>1-5  |
| 【AML】A-triple V (VP-16+Ara-<br>C+VCR+VDS) (JALSGスタイル④コース<br>目)       | 14日     | 1コース              | エトポシド<br>キロサイド<br>オンコピン<br>フィルデシン            | 100 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/m <sup>2</sup><br>0.8 mg/m <sup>2</sup><br>2 mg/m <sup>2</sup>                        | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>点滴       | 1-5<br>1-5<br>8<br>10<br>最大2mg/body<br>最大4mg/body   |
| 【AML】Ara-C大量   | 7日      | 4コース              | キロサイドN                                       | 4000 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                         | 1-5<br>2000mg/m <sup>2</sup> ×2回  |
| 【AML】Ara-C少量(持続静注)   | 14日     | PDまで              | キロサイド  | 20 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                         | 1-14  |
| 【AML】Ara-C少量(皮下注)  | 14日     | PDまで              | キロサイド  | 20 mg/m <sup>2</sup>  | 皮下注                        | 1-14<br>10mg/m <sup>2</sup> ×2回   |
| 【AML】GO  | 14日     | 2コース              | マイロターグ                                       | 9 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                         | 1   |
| 【AML】CAG (ACR+Ara-C少量皮下注)  | 14日     |                   | アクラシン<br>キロサイド                               | 14 mg/m <sup>2</sup><br>20 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴<br>皮下注                  | 1-4<br>1-14<br>10mg/m <sup>2</sup> ×2回  |
| 【AML】CAG (ACR+Ara-C少量持続点滴)   | 14日     |                   | アクラシン<br>キロサイド                               | 14 mg/m <sup>2</sup><br>20 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴<br>点滴                   | 1-4<br>1-14   |
| 【AML】中等量Ara-C+MIT  | 7日      | 1コース              | キロサイドN<br>ノバントロン                             | 1000 mg/m <sup>2</sup><br>7 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴<br>点滴                   | 1-6<br>1-3<br>500mg/m <sup>2</sup> ×2回  |
| 【AML】VP-16+中等量Ara-C  | 7日      | 1コース              | エトポシド<br>キロサイド                               | 100 mg/m <sup>2</sup><br>1000 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴<br>点滴                   | 1-5<br>1-6<br>500mg/m <sup>2</sup> ×2回  |
| 【AML】FLAGM (FLU+Ara-C+MIT)   | 7日      | 1コース              | グラン<br>フルダラ<br>キロサイドN<br>ノバントロン              | 300 mg/m <sup>2</sup><br>30 mg/m <sup>2</sup><br>4000 mg/m <sup>2</sup><br>10 mg/m <sup>2</sup>                       | 皮下注<br>点滴<br>点滴<br>点滴      | 1-4<br>2-5<br>2-5<br>4-6<br>15mg/m <sup>2</sup> ×2回<br>2000mg/m <sup>2</sup> ×2回              |
| 【ALL】JALSG ALL202-U (7 Reinduction<br>therapy: VCR) week 26,46,66,86 | 28日     |                   | オンコピン<br>ロイナーゼ<br>エンドキサン<br>ブレドニン            | 1.5 mg/m <sup>2</sup><br>10000 U/m <sup>2</sup><br>600 mg/m <sup>2</sup><br>40 mg/m <sup>2</sup>                      | 点滴<br>筋注<br>点滴<br>経口       | 1,8,15<br>1,8,15<br>8<br>1-14<br>最大2mg/body<br>漸減   |
| 【ALL】JALSG ALL202-U (9 Reinduction<br>therapy: VDS) week 36,56,76,96 | 28日     |                   | フィルデシン<br>ロイナーゼ<br>テラルピシン<br>ブレドニン           | 3 mg/m <sup>2</sup><br>10000 U/m <sup>2</sup><br>25 mg/m <sup>2</sup><br>40 mg/m <sup>2</sup>                         | 点滴<br>筋注<br>点滴<br>経口       | 1,8,15<br>1,8,15<br>8<br>1-14<br>最大4mg/body<br>漸減   |
| 【ALL】JALSG ALL202-U (9 Reinduction<br>therapy: VCR) week 36,56,76,96 | 28日     |                   | オンコピン<br>ロイナーゼ<br>テラルピシン<br>ブレドニン            | 1.5 mg/m <sup>2</sup><br>10000 U/m <sup>2</sup><br>25 mg/m <sup>2</sup><br>40 mg/m <sup>2</sup>                       | 点滴<br>筋注<br>点滴<br>経口       | 1,8,15<br>1,8,15<br>8<br>1-14<br>最大2mg/body<br>漸減   |
| 【ALL】JALSG ALL202-U (7 Reinduction<br>therapy: VDS) week 26,46,66,86 | 28日     |                   | フィルデシン<br>ロイナーゼ<br>エンドキサン<br>ブレドニン           | 3 mg/m <sup>2</sup><br>10000 U/m <sup>2</sup><br>600 mg/m <sup>2</sup><br>40 mg/m <sup>2</sup>                        | 点滴<br>筋注<br>点滴<br>経口       | 1,8,15<br>1,8,15<br>8<br>1-14<br>最大4mg/body<br>漸減   |
| 【ALL】JALSG ALL202-U (6<br>Maintenance therapy) week 20-25<br>CNS(+)  | 42日     |                   | メソトレキセート<br>ロイケリン                            | 150 mg/m <sup>2</sup><br>50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴<br>経口                   | 29<br>1-28  |
| 【ALL】JALSG ALL202-U (6<br>Maintenance therapy) week 20-25<br>CNS(-)  | 42日     |                   | メソトレキセート<br>ロイケリン                            | 150 mg/m <sup>2</sup><br>50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴<br>経口                   | 1,15,29<br>1-28   |
| 【ALL】JALSG ALL202-U (5<br>Reconsolidation therapy) week 16-19        | 28日     |                   | テラルピシン<br>キロサイド<br>エンドキサン<br>ロイケリン           | 25 mg/m <sup>2</sup><br>75 mg/m <sup>2</sup><br>750 mg/m <sup>2</sup><br>50 mg/m <sup>2</sup>                         | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>経口       | 1,2<br>1-6,8-13<br>1,8<br>1-14  |
| 【ALL】JALSG ALL202-U (4 Reinduction<br>therapy: VDS) week 12-15       | 28日     |                   | テラルピシン<br>フィルデシン<br>エンドキサン<br>ロイナーゼ<br>ブレドニン | 25 mg/m <sup>2</sup><br>3 mg/m <sup>2</sup><br>500 mg/m <sup>2</sup><br>6000 U/m <sup>2</sup><br>40 mg/m <sup>2</sup> | 点滴<br>点滴<br>点滴<br>筋注<br>経口 | 1,8<br>1,8,15<br>1,8<br>1,3,5,8,10,12<br>1-14<br>15-18<br>30→20→10→5mg/<br>m <sup>2</sup> と減量 |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注)臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名   | 1コースの日数 | 予定コース数 | 使用抗がん薬            | 投与量                    | 投与方法  | 投与日                             |                                 |
|---|---------|--------|-------------------|------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| 【ALL】JALSG ALL202-U (4 Reinduction therapy:VCR) week 12-15            | 28日     |        | テラルピシン            | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1,8                             |                                 |
|   |         |        | オンコピン             | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,8,15                          | 最大2mg/body                      |
|   |         |        | エンドキサン            | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,8                             |                                 |
|   |         |        | ロイナーゼ             | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 筋注    | 1,3,5,8,10,12                   |                                 |
|   |         |        | プレドニン             | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-14                            |                                 |
|   |         |        | mg/m <sup>2</sup> | 経口                     | 15-18 | 30→20→10→5mg/m <sup>2</sup> と減量 |                                 |
| 【ALL】JALSG ALL202-U (3 Sanctuary therapy) week 10-11                  | 14日     |        | メソトレキセート          | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1,8                             |                                 |
|   |         |        | ※ロイコボリン           | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 静注    | 3,4,10,11                       |                                 |
| 【ALL】JALSG ALL202-U (2 Consolidation therapy) week 6-9                | 28日     |        | テラルピシン            | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1,2                             |                                 |
|   |         |        | キロサイド             | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1-6,8-13                        |                                 |
|   |         |        | エンドキサン            | 750 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,8                             |                                 |
|   |         |        | ロイケリン             | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-14                            |                                 |
| 【ALL】JALSG ALL202-U (1 Induction therapy) week 1-5                    | 35日     |        | プレドニン             | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-7                             |                                 |
|   |         |        | テラルピシン            | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 8,9                             |                                 |
|   |         |        | オンコピン             | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 8,15,22,29                      |                                 |
|   |         |        | デキサート             | 10 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 8-14                            |                                 |
|   |         |        | エンドキサン            | 1200 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 10                              |                                 |
|   |         |        | ロイナーゼ             | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 15,17,19,21,23,25,27,29         |                                 |
|   |         |        | プレドニン             | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 15-28                           |                                 |
|   |         |        |                   | mg/m <sup>2</sup>      | 経口    | 29-32                           | 30→20→10→5mg/m <sup>2</sup> と減量 |
|   |         |        |                   |                        |       |                                 |                                 |
| 【ALL】JALSG ALL202-U (8 Reinduction therapy) week 30,40,50,60,70,80,90 | 42日     |        | メソトレキセート          | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,15,29                         |                                 |
|   |         |        | ロイケリン             | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-28                            | 分1寝る前                           |
| 【ALL】JALSG ALL202-O (C3 reinduction phase: VDS)                       | 49日     |        | ドキシゾビシン           | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1,8,15                          |                                 |
|   |         |        | フィルデシン            | 3 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴    | 1,8,15                          | 最大4mg/body                      |
|   |         |        | デカドロン             | 10 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-8, 15-22                      |                                 |
|   |         |        | キロサイド             | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 29-33, 36-40                    |                                 |
|   |         |        | エンドキサン            | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 29                              |                                 |
|   |         |        | ロイケリン             | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 29-42                           |                                 |
| 【ALL】JALSG ALL202-O (Induction therapy) week 1-5                      | 35日     |        | ダウノマイシン           | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1-3                             |                                 |
|   |         |        | オンコピン             | 1.3 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,8,15,22                       | 最大2mg/body                      |
|   |         |        | エンドキサン            | 1200 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1                               |                                 |
|   |         |        | ロイナーゼ             | 3000 U/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 9,11,13,16,18,20                |                                 |
|   |         |        | プレドニン             | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-21                            |                                 |
|   |         |        |                   |                        | 経口    | 22-                             | 1週間で減量・終了                       |
| 【ALL】JALSG ALL202-O (C2,C5 MTX phase) Arm B                           | 28日     |        | オンコピン             | 1.3 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,15                            |                                 |
|   |         |        | メソトレキセート          | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,15                            |                                 |
|   |         |        | ロイケリン             | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-21                            |                                 |
| 【ALL】JALSG ALL202-O (Maintenance therapy)                             | 35日     |        | オンコピン             | 1.3 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                               | 最大2mg/body                      |
|   |         |        | プレドニン             | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-5                             |                                 |
|   |         |        | メソトレキセート          | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1,8,15,22                       |                                 |
|   |         |        | ロイケリン             | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-28                            |                                 |
| 【ALL】JALSG ALL202-O (C3 reinduction phase: VCR)                       | 49日     |        | ドキシゾビシン           | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1,8,15                          |                                 |
|   |         |        | オンコピン             | 1.3 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,8,15                          | 最大2mg/body                      |
|   |         |        | デカドロン             | 10 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-8, 15-22                      |                                 |
|   |         |        | キロサイド             | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 29-33, 36-40                    |                                 |
|   |         |        | エンドキサン            | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 29                              |                                 |
|   |         |        | ロイケリン             | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 29-42                           |                                 |
| 【ALL】JALSG ALL202-O (C2,C5 MTX phase) Arm A ≥50歳                      | 28日     |        | オンコピン             | 1.3 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,15                            |                                 |
|   |         |        | メソトレキセート          | 1500 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1,15                            |                                 |
|   |         |        | ロイケリン             | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-21                            |                                 |
| 【ALL】JALSG ALL202-O (C2,C5 MTX phase) Arm A                           | 28日     |        | オンコピン             | 1.3 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,15                            |                                 |
|   |         |        | メソトレキセート          | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1,15                            |                                 |
|   |         |        | ロイケリン             | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-21                            |                                 |
| 【ALL】JALSG ALL202-O (C1,C4 HdAC phase) ≥60歳 or SCr >2.0mg/dL          | 7日      |        | キロサイドN            | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1-3                             | 1回量                             |
|   |         |        | エトポシド             | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1-3                             |                                 |
|   |         |        | デキサート             | 33 mg/body             | 点滴    | 1-3                             |                                 |
| 【ALL】JALSG ALL202-O (Induction therapy) week 1-5 ≥60歳                 | 35日     |        | ダウノマイシン           | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1-3                             |                                 |
|   |         |        | オンコピン             | 1.3 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,8,15,22                       | 最大2mg/body                      |
|   |         |        | エンドキサン            | 800 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                               |                                 |
|   |         |        | ロイナーゼ             | 3000 U/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 9,11,13,16,18,20                |                                 |
|   |         |        | プレドニン             | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-7                             |                                 |
|   |         |        |                   |                        | 経口    | 8-                              | 1週間で減量・終了                       |
| 【ALL】JALSG ALL202-O (C1 HdAC phase)                                   | 7日      |        | キロサイドN            | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1-3                             | 1回量                             |
|   |         |        | エトポシド             | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1-3                             |                                 |
|   |         |        | デキサート             | 33 mg/body             | 点滴    | 1-3                             |                                 |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                                | 1コースの日数 | 予定コース数   | 使用抗がん薬               | 投与量                    | 投与方法 | 投与日                       |  |
|--------------------------------------|---------|--|----------------------|------------------------|------|---------------------------|--|
| 【ALL】Hyper-CVAD<br>(DEX+CPA+VCR+DXR) | 21日     | 4コース(M/A療法と交互に)                                      | デキサート                | 33 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-4, 11-14                |  |
|                                      |         |  | エンドキサン               | 300 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-3                       | 1回量  |
|                                      |         |  | オンコピン                | 1.3 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 4,11                      |  |
|                                      |         |  | ドキシソルビシン             | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 4                         |  |
| 【ALL】MTX+Ara-C (M/A療法)               | 21日     | 4コース(Hyper-CVAD療法と交互に)                               | メソトレキセート             | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1                         | 200mg/m <sup>2</sup> (2hr),<br>800mg/m <sup>2</sup> (22hr) |
|                                      |         |  | キロサイドN               | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 2,3                       | 1回量  |
| 【ALL】VDS                             | 7日      |  | フィルデシン               | 3 mg/body              | 点滴   | 1                         |  |
| 【白血病】VCR                             | 7日      |  | オンコピン                | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                         | 最大2mg/body   |
| 【CLL】Benda                           | 28日     | 6コース   | トレアキシン               | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,2                       |  |
| 【ALL】BLIN                            | 日       | 9コース   | ビーリンサイト(≧体重45kg)     | 9 μg/body              | 点滴   | 1-7                       | 1コース目  |
|                                      |         |  |                      | 28 μg/body             | 点滴   | 8-28                      | 1コース目  |
|                                      |         |  |                      | 28 μg/body             | 点滴   | 1-28                      | 2コース目以降  |
|                                      |         |  | ビーリンサイト(<体重45kg)     | 5 μg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1-7                       | 1コース目 (最大<br>9μg/body)                                     |
|                                      |         |  |                      | 15 μg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 8-28                      | 1コース目 (最大<br>28μg/body)                                    |
|                                      |         |  | 15 μg/m <sup>2</sup> | 点滴                     | 1-28 | 2コース目以降 (最大<br>28μg/body) |  |
| 【APL】ATO                             | 7日      | 寛解導入療法:<br>CRIに至るまで<br>連日投与(60回<br>まで)、寛解後<br>療法:25回 | トリセノックス              | 0.15 mg/kg             | 点滴   | 1-7                       |  |
| 【ALL】Besponsa                        | 日       | 最大6コース   | ベスポンサ                | 0.8 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   |                           |  |
|                                      |         |  |                      | 0.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   |                           |  |
| <b>骨髄異形成症候群</b>                      |         |  |                      |                        |      |                           |  |
| 【MDS】AZA                             | 28日     |  | ビダーザ                 | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 皮下注  | 1-5(or7)                  | 静注も可   |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名  | 1コースの日数 | 予定コース数 | 使用抗がん薬   | 投与量                   | 投与方法  | 投与日  |
|--|---------|--------|----------|-----------------------|-------|------|
| <b>悪性リンパ腫</b>                                    |         |        |          |                       |       |      |
| 【NHL】RIT   | 7日      | 8コース   | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
| 【NHL】CHOP (PSL+DXR+VCR+CPA)                      | 21日     | 6~8コース | ブレドニン    | 100 mg/body           | 点滴/経口 | 1-5  |
|  |         |        | ドキシソルビシン | 50 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1    |
|  |         |        | オンコピン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
|  |         |        | エンドキサン   | 750 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
| 【NHL】R-CHOP (RIT+PSL+DXR+VCR+CPA)(別日)            | 21日     | 8コース   | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | A    |
|  |         |        | ブレドニン    | 100 mg/body           | 点滴/経口 | B+4日 |
|  |         |        | ドキシソルビシン | 50 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | B    |
|  |         |        | オンコピン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | B    |
| 【NHL】R-CHOP (RIT+PSL+DXR+VCR+CPA)(同日)            | 21日     | 8コース   | ブレドニン    | 100 mg/body           | 点滴/経口 | 1-5  |
|  |         |        | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
|  |         |        | ドキシソルビシン | 50 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1    |
|  |         |        | オンコピン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
| 【NHL】THP-COP (PSL+THP+VCR+CPA)                   | 21日     | 6~8コース | ブレドニン    | 60 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴/経口 | 1-5  |
|  |         |        | テラルピシン   | 50 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1    |
|  |         |        | オンコピン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
|  |         |        | エンドキサン   | 750 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
| 【NHL】THP-COP (PSL+THP+VCR+CPA)(70~79歳)           | 21日     | 6~8コース | ブレドニン    | 30 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴/経口 | 1-5  |
|  |         |        | テラルピシン   | 40 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1    |
|  |         |        | オンコピン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
|  |         |        | エンドキサン   | 650 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
| 【NHL】THP-COP (PSL+THP+VCR+CPA)(80歳以上)            | 21日     | 6~8コース | ブレドニン    | 30 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴/経口 | 1-5  |
|  |         |        | テラルピシン   | 30 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1    |
|  |         |        | オンコピン    | 1 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1    |
|  |         |        | エンドキサン   | 500 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
| 【NHL】R-THP-COP (RIT+PSL+THP+VCR+CPA)(別日)         | 21日     | 8コース   | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | A    |
|  |         |        | ブレドニン    | 60 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴/経口 | B+4日 |
|  |         |        | テラルピシン   | 50 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | B    |
|  |         |        | オンコピン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | B    |
| 【NHL】R-THP-COP (RIT+PSL+THP+VCR+CPA)(70~79歳)(別日) | 21日     | 8コース   | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | A    |
|  |         |        | ブレドニン    | 30 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴/経口 | B+4日 |
|  |         |        | テラルピシン   | 40 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | B    |
|  |         |        | オンコピン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | B    |
| 【NHL】R-THP-COP (RIT+PSL+THP+VCR+CPA)(80歳以上)(別日)  | 21日     | 8コース   | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | A    |
|  |         |        | ブレドニン    | 30 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴/経口 | B+4日 |
|  |         |        | テラルピシン   | 30 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | B    |
|  |         |        | オンコピン    | 1 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | B    |
| 【NHL】R-THP-COP (RIT+PSL+THP+VCR+CPA)(同日)         | 21日     | 8コース   | ブレドニン    | 60 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴/経口 | 1-5  |
|  |         |        | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
|  |         |        | テラルピシン   | 50 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1    |
|  |         |        | オンコピン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
| 【NHL】R-THP-COP (RIT+PSL+THP+VCR+CPA)(70~79歳)(同日) | 21日     | 8コース   | ブレドニン    | 30 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴/経口 | 1-5  |
|  |         |        | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
|  |         |        | テラルピシン   | 40 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1    |
|  |         |        | オンコピン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
|  |         |        | エンドキサン   | 650 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
|  |         |        | エンドキサン   | 650 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
|  |         |        | エンドキサン   | 650 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |
|  |         |        | エンドキサン   | 650 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1    |

PD: Progressive Disease, AUC: カル/パート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注)臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません



| レジメン名  | 1コースの日数 | 予定コース数                  | 使用抗がん薬   | 投与量                    | 投与方法  | 投与日              |                                  |
|--|---------|-------------------------|----------|------------------------|-------|------------------|----------------------------------|
| 【NHL】R-THP-COP<br>(RIT+PSL+THP+VCR+CPA)(80歳以上)<br>(同日) | 21日     | 8コース                    | ブレドニン    | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴/経口 | 1-5              |                                  |
|  |         |                         | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                |                                  |
|  |         |                         | テラルピシン   | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1                |                                  |
|  |         |                         | オンコビン    | 1 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴    | 1                | 最大2.0mg/body                     |
| 【NHL】CVP (PSL+VCR+CPA)                                 | 21日     | 6~8コース                  | ブレドニン    | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴/経口 | 1-5              |                                  |
|  |         |                         | オンコビン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                | 最大2.0mg/body                     |
|  |         |                         | エンドキサン   | 750 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                |                                  |
| 【NHL】R-CVP (RIT+PSL+VCR+CPA)(別日)                       | 21日     | 8コース                    | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | A                |                                  |
|  |         |                         | ブレドニン    | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴/経口 | B+4日             |                                  |
|  |         |                         | オンコビン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | B                | 最大2.0mg/body                     |
|  |         |                         | エンドキサン   | 750 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | B                |                                  |
| 【NHL】R-CVP (RIT+PSL+VCR+CPA)(同日)                       | 21日     | 8コース                    | ブレドニン    | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴/経口 | 1-5              |                                  |
|  |         |                         | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                |                                  |
|  |         |                         | オンコビン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                | 最大2.0mg/body                     |
|  |         |                         | エンドキサン   | 750 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                |                                  |
| 【NHL,MCL】Benda   | 21日     | PDまで                    | トレアキシ    | 120 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,2              |                                  |
| 【NHL,MCL】RIT+Benda(別日)                                 | 28日     | 6コース                    | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                |                                  |
|  |         |                         | トレアキシ    | 90 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 8,9              |                                  |
| 【NHL,MCL】RIT+Benda(同日)                                 | 28日     | 6コース                    | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                |                                  |
|  |         |                         | トレアキシ    | 90 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1,2              |                                  |
| 【NHL】RIT(維持)   | 56日     | 12コース                   | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                |                                  |
| 【NHL】CHASE (DEX+CPA+VP-16+Ara-C)                       | 21日     | 5コース                    | デキサート    | 33 mg/body             | 点滴    | 1-3              |                                  |
|  |         |                         | エンドキサン   | 1200 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1                |                                  |
|  |         |                         | エトポシド    | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1-3              |                                  |
|  |         |                         | キロサイドN   | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 2,3              |                                  |
| 【NHL】DeVIC (DEX+CBDC+VP-16+IFM)                        | 21日     | 4コース                    | デキサート    | 33 mg/body             | 点滴    | 1-3              |                                  |
|  |         |                         | カルボプラチン  | 300 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                |                                  |
|  |         |                         | エトポシド    | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1-3              |                                  |
|  |         |                         | イホマイド    | 1500 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1-3              |                                  |
|  |         |                         | ※ウロミテキサン | 300 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1-3              |                                  |
| 【NHL】EPOCH (VP-16+VCR+DXR+CPA+PSL)                     | 21日     | 8コース                    | エトポシド    | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1-4              |                                  |
|  |         |                         | オンコビン    | 0.4 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1-4              |                                  |
|  |         |                         | ドキシソルピシン | 10 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1-4              |                                  |
|  |         |                         | エンドキサン   | 750 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 5                |                                  |
|  |         |                         | ブレドニン    | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-5              |                                  |
| 【NHL】DA-EPOCH-R (PSL+VP-16+VCR+DXR+CPA+RIT)            | 21日     | 8コース                    | ブレドニン    | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-5              | 分2                               |
|  |         |                         | エトポシド    | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈  | 1-4              |                                  |
|  |         |                         | オンコビン    | 0.4 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 1-4              |                                  |
|  |         |                         | ドキシソルピシン | 10 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈  | 1-4              |                                  |
|  |         |                         | エンドキサン   | 750 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 5                |                                  |
|  |         |                         | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | ※                | 投与日は症状に応じて変更                     |
| 【NHL】R-IVAC (Ara-C+VP-16+IFM+RIT)                      | 21日     | 2コース<br>(CODOX-M療法と交互に) | キロサイドN   | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1,2              | 1回量 >65歳 : 1000mg/m <sup>2</sup> |
|  |         |                         | エトポシド    | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1-5              |                                  |
|  |         |                         | イホマイド    | 1500 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1-5              | >65歳 : 1000mg/m <sup>2</sup>     |
|  |         |                         | ※ウロミテキサン | 300 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1-5              | >65歳 : 200mg/m <sup>2</sup>      |
|  |         |                         | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 6                |                                  |
|  |         |                         |          |                        |       |                  |                                  |
| 【NHL】ESHAP (mPSL+VP-16+CDDP+Ara-C)                     | 21日     | 8コース                    | ソル・メドロール | 500 mg/body            | 点滴    | 1-5              |                                  |
|  |         |                         | エトポシド    | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1-4              |                                  |
|  |         |                         | シスプラチン   | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1-4              |                                  |
|  |         |                         | キロサイドN   | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 5                |                                  |
| 【NHL】dose-modified R-CODOX-M (RIT+DXR+VCR+CPA+MTX)     | 21日     | 2コース (IVAC療法と交互に)       | ドキシソルピシン | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1                |                                  |
|  |         |                         | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,8              | 最大2mg/body                       |
|  |         |                         | エンドキサン   | 800 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                |                                  |
|  |         |                         |          | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 2-5              |                                  |
|  |         |                         | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 6                |                                  |
|  |         |                         | メソトレキセート | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 10               |                                  |
| 【NHL】RIT+VCR   | 7日      |                         | リツキシマブ   | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                |                                  |
|  |         |                         | オンコビン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                | 最大2mg/body                       |
| 【NHL】CPT-11  | 35日     | PDまで                    | イリノテカン   | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1-3, 8-10, 15-17 |                                  |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                                      | 1コースの日数 | 予定コース数                            | 使用抗がん薬   | 投与量                    | 投与方法  | 投与日                     |  |
|--|---------|-----------------------------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|--|
| 【悪性リンパ腫】DHAP<br>(DEX+CDDP+high-dose Ara-C) | 21日     | 10コース                             | デキサート    | 33 mg/body             | 点滴    | 1-4                     |  |
|  |         |                                   | シスプラチン   | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                       |  |
|  |         |                                   | キロサイドN   | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 2                       | 1回量  |
| 【BL】Hyper-CVAD<br>(DEX+CPA+VCR+DXR)        | 21日     | 4コース(M/A療法と交互に)                   | デキサート    | 33 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1-4, 11-14              |  |
|  |         |                                   | エンドキサン   | 300 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1-3                     | 1回量  |
|  |         |                                   | オンコビン    | 1.3 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 4,11                    |  |
|  |         |                                   | ドキシソルビシン | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 4                       |  |
| 【BL】MTX+Ara-C (M/A療法)                      | 21日     | 4コース(Hyper-CVAD療法と交互に)            | メソトレキセート | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1                       | 200mg/m <sup>2</sup> (2hr),<br>800mg/m <sup>2</sup> (22hr) |
|  |         |                                   | キロサイドN   | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 2,3                     | 1回量  |
|  |         |                                   |          | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 2,3                     | 1回量 60歳以上の<br>場合   |
|  |         |                                   | 0        |                        |       |                         |  |
| 【PCNLS】大量Ara-C                             | 28日     | 2コース                              | キロサイドN   | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1,2                     | 最大6000mg/dayまで   |
| 【MCL】BOR                                   | 21日     | PDまで                              | ベルケイド    | 1.3 mg/m <sup>2</sup>  | 皮下注   | 1,4,8,11                | 静注も可   |
| 【ENKL】SMILE (MTX+DEX+IFM+VP-16+L-ASP)      | 28日     | 2コース→SMILE療法追加 or 造血幹細胞移植         | メソトレキセート | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1                       |  |
|  |         |                                   | デキサート    | 33 mg/body             | 点滴    | 2-4                     |  |
|  |         |                                   | イホマイド    | 1500 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 2-4                     |  |
|  |         |                                   | エトポシド    | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 2-4                     |  |
|  |         |                                   | ロイナーゼ    | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 8,10,12,14,<br>16,18,20 |  |
|  |         |                                   | ※ウロミテキサン | 300 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 2,3,4                   |  |
| 【PTCL, CTCL】MOG                            | 7日      | 8コース(CTCLの場合は、1週間隔で5回点滴→その後は2週間隔) | ポテリジオ    | 1 mg/kg                | 点滴    | 1                       |  |
| 【悪性リンパ腫】GEM                                | 28日     | PDまで                              | ゲムシタビン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1,8,15                  |  |
| 【悪性リンパ腫】VCR                                | 7日      |                                   | オンコビン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                       | 最大2mg/body   |
| 【悪性リンパ腫】DEX+GEM+CBDCA                      | 21日     | PDまで                              | デキサート    | 40 mg/body             | 点滴/経口 | 1-4                     | day1は33mg (div)  |
|  |         |                                   | ゲムシタビン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴    | 1,8                     |  |
|  |         |                                   | カルボプラチン  | 5 AUC                  | 点滴    | 1                       |  |
| 【HL】ABVD (DXR+BLM+VBL+DTIC)                | 28日     | 下記参照                              | ドキシソルビシン | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1,15                    |  |
|  |         |                                   | ブレオ      | 10 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1,15                    | 最大15mg/body  |
|  |         |                                   | エクザール    | 6 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴    | 1,15                    | 最大10mg/body  |
|  |         |                                   | ダカルバジン   | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,15                    |  |
| 【HL】ABVd (DXR+BLM+VBL+DTIC)                | 28日     | 下記参照                              | ドキシソルビシン | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1,15                    |  |
|  |         |                                   | ブレオ      | 9 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴    | 1,15                    | 最大15mg/body  |
|  |         |                                   | エクザール    | 6 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴    | 1,15                    | 最大10mg/body  |
|  |         |                                   | ダカルバジン   | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,15                    |  |
| 【HL】BREN                                   | 21日     | 16コース                             | アドセトリス   | 1.8 mg/kg              | 点滴    | 1                       | 体重が100kgを超える場合は100kgとして換算                                  |
| 【HL】Nivo                                   | 日       | PDまで                              | オブジーボ    | 240 mg/body            | 点滴    | 1                       | q2w  |
|  |         |                                   |          | 480 mg/body            | 点滴    | 1                       | q4w  |
| 【HL】Pembro                                 | 21日     | PDまで                              | キイトルーダ   | 200 mg/body            | 点滴    | 1                       | q3w  |
|  |         |                                   |          | 400 mg/body            | 点滴    | 1                       | q6w  |
| 【PTCL】ROMI                                 | 28日     | PDまで                              | イストダックス  | 14 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1,8,15                  |  |
| 【FL】G-CHOP<br>(OBIN+PSL+DXR+VCR+CPA)       | 21日     | 6コース→OBIN2コース                     | ガザイバ     | 1000 mg/body           | 点滴    | 1,(8),(15)              | 1コース目のみ<br>day8, 15投与                                      |
|  |         |                                   | プレドニン    | 100 mg/body            | 点滴/経口 | 1-5                     |  |
|  |         |                                   | ドキシソルビシン | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1                       |  |
|  |         |                                   | オンコビン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                       | 最大2mg/body   |
| 【FL】G-CVP (OBIN+PSL+VCR+CPA)               | 21日     | 8コース                              | ガザイバ     | 1000 mg/body           | 点滴    | 1,(8),(15)              | 1コース目のみ<br>day8, 15投与                                      |
|  |         |                                   | プレドニン    | 100 mg/body            | 点滴/経口 | 1-5                     |  |
|  |         |                                   | オンコビン    | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                       | 最大2.0mg/body   |
|  |         |                                   | エンドキサン   | 750 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1                       |  |
| 【FL】G-Benda (OBIN+Benda)                   | 28日     | 6コース                              | ガザイバ     | 1000 mg/body           | 点滴    | 1,(8),(15)              | 1コース目のみ<br>day8, 15投与                                      |
|  |         |                                   | トレアキシシン  | 90 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1,2                     |  |
| 【FL】OBIN                                   | 21日     | G-CHOP6コース後に2コース施行                | ガザイバ     | 1000 mg/body           | 点滴    | 1                       |  |
| 【FL】OBIN (維持)                              | 56日     | 最長2年間                             | ガザイバ     | 1000 mg/body           | 点滴    | 1                       |  |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                                    | 1コースの日数 | 予定コース数         | 使用抗がん薬             | 投与量                    | 投与方法    | 投与日         |                            |
|--|---------|----------------|--------------------|------------------------|---------|-------------|----------------------------|
| 【NHL】RIT+ZEVALIN                         | 1日      | 2コース(ゼヴァリン投与前) | リツキシマブ             | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴      |             | 90Y、111In投与前               |
|  |         |                | ゼヴァリン イットリウム(90Y)  | 0                      |         | 1           |                            |
|  |         |                | ゼヴァリン インジウム(111In) | 0                      |         | 7 or 8 or 9 |                            |
| 【HL】A+AVD (DXR+VBL+DTIC+BREN)            | 28日     | 6コース           | ドキシソルピシン           | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴      | 1,15        |                            |
|  |         |                | エクザール              | 6 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴      | 1,15        | 最大10mg/body                |
|  |         |                | ダカルバジン             | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴      | 1,15        |                            |
|  |         |                | アドセトリス             | 1.2 mg/kg              | 点滴      | 1,15        |                            |
| 【悪性リンパ腫】R-GDP (DEX+GEM+CBDCA)            | 21日     | PDまで           | リツキシマブ             | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | ゲムシタビン             | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴      | 1,8         |                            |
|  |         |                | カルボプラチン            | 5 AUC                  | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | デキサート              | 33 mg/body             | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | レナデックス(デカドロン)      | 40 mg/body             | 経口      | 2-4         |                            |
| 【悪性リンパ腫】BUS+THIO(移植前治療)                  | 8日      | (基本的に)1コース     | ブスルフェクス            | 3.2 mg/kg              | 点滴      | 1-4         | 移植予定日の8, 7, 6, 5日前         |
|  |         |                | リサイオ               | 5 mg/kg                | 点滴      | 5-6         | 移植予定日の4, 3日前               |
| 【悪性リンパ腫】modified RELAL                   | 21日     | 1:             | キロサイド              | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴      | 1-4         |                            |
|  |         |                | フィルデシン             | 2 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | ノバントロン             | 12 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴      | 1-3         |                            |
|  |         |                | エンドキサン             | 1200 mg/m <sup>2</sup> | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | メソトレキセート           | 160 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴      | 5           |                            |
|  |         |                |                    | 340 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴      | 5           |                            |
| 【DLBCL】RIT+Benda+Pola                    | 21日     | 6:             | リツキシマブ             | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴      |             | 各コースday1                   |
|  |         |                | ポライビー              | 1.8 mg/kg              | 点滴      |             | 1コース目day2、2コース目以降はday1     |
|  |         |                | トリアキシン             | 90 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴      |             | 1コース目day2-3、2コース目以降はday1-2 |
| 【DLBCL】Pola+R-CHP (Pola+RIT+DXR+CPA)(別日) | 21日     | 6コース           | ポライビー              | 1.8 mg/kg              | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | リツキシマブ             | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴      | 8           |                            |
|  |         |                | ドキシソルピシン           | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | エンドキサン             | 750 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | プレドニン              | 100 mg/body            | 点滴/経口   | 1-5         |                            |
| 【DLBCL】Pola+R-CHP (Pola+RIT+DXR+CPA)     | 21日     | 6コース           | ポライビー              | 1.8 mg/kg              | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | リツキシマブ             | 375 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | ドキシソルピシン           | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | エンドキサン             | 750 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | プレドニン              | 100 mg/body            | 点滴/経口   | 1-5         |                            |
| 【PTCL】A+CHP(DXR+CPA+BREN)                | 21日     | 6~8            | プレドニン              | 100 mg/body            | 点滴/経口   | 1-5         |                            |
|  |         |                | ドキシソルピシン           | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | エンドキサン             | 750 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴      | 1           |                            |
|  |         |                | アドセトリス             | 1.8 mg/kg              | 点滴      | 1           | 最大180mg/body               |
|  |         |                |                    | レミトロ                   | 9 µg/kg | 点滴          | 1-5                        |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
(注)臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名                      | 1コースの日数               | 予定コース数      | 使用抗がん薬               | 投与量                                 | 投与方法                   | 投与日             |                        |                   |           |         |
|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------|---------|
| <b>多発性骨髄腫</b>              | 【MM】high dose CPA     | 21日         | 1コース                 | エンドキサン                              | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴              | 1,2                    |                   |           |         |
|                            |                       |             |                      | ※ウロミテキサン                            | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴              | 1,2                    | CPA投与直前、4時間後、8時間後 |           |         |
| 【MM】BOR (day1,4,8,11)      | 21日                   | 8コース        | ベルケイド<br>(デキサメタゾン)   | 1.3 mg/m <sup>2</sup><br>40 mg/body | 皮下注<br>経口              | 1,4,8,11        | 静注も可<br>備考参照           |                   |           |         |
| 【MM】BOR (day1,8,15,22)     | 35日                   | PDまで        | ベルケイド                | 1.3 mg/m <sup>2</sup>               | 皮下注                    | 1,8,15,22       | 静注も可                   |                   |           |         |
| 【MM】CAR+LEN+DEX            | 28日                   | PDまで(18コース) | カイプロリス               | 20 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴                     | 1,2             | 1コース目                  |                   |           |         |
|                            |                       |             |                      | 27 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴                     | 8,9,15,16       | 1コース目                  |                   |           |         |
|                            |                       |             |                      | 27 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴                     | 1,2,8,9,15,16   | 2~12コース目               |                   |           |         |
|                            |                       |             |                      | 27 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴                     | 1,2,15,16       | 13コース目以降               |                   |           |         |
|                            |                       |             | レブラミド                | 25 mg/body                          | 経口                     | 1-21            | 投与量調節可                 |                   |           |         |
| レナデックス(デカドロン)              | 40 mg/body            | 経口          | 1,8,15,22            | カイブリス投与前                            |                        |                 |                        |                   |           |         |
| 【MM】DEX+ELO+LEN            | 28日                   | PDまで        | エムプリシティ              | 10 mg/kg                            | 点滴                     | 1,8,15,22       | 2コース目まで                |                   |           |         |
|                            |                       |             |                      | 10 mg/kg                            | 点滴                     | 1,15            | 3コース目以降                |                   |           |         |
|                            |                       |             | レブラミド                | 25 mg/body                          | 経口                     | 1-21            |                        |                   |           |         |
|                            |                       |             | デキサート                | 33 mg/body                          | 点滴                     | ELO投与日          |                        |                   |           |         |
|                            |                       |             | レナデックス(デカドロン)        | 40 mg/body                          | 経口                     | 8,22            | 3コース目以降                |                   |           |         |
| 【MM】DEX+CAR_twicely weekly | 28日                   | PDまで        | デキサート                | 16.5 mg/body                        | 点滴                     | 1,2,8,9,15,16   |                        |                   |           |         |
|                            |                       |             | レナデックス(デカドロン)        | 20 mg/body                          | 経口                     | 22,23           |                        |                   |           |         |
|                            |                       |             | カイプロリス               | 20 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴                     | 1,2             | 1コース目                  |                   |           |         |
|                            |                       |             |                      | 56 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴                     | 8,9,15,16       | 1コース目                  |                   |           |         |
|                            |                       |             |                      | 56 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴                     | 1,2,8,9,15,16   | 2コース目以降                |                   |           |         |
| 【MM】DEX+DAR+LEN            | 28日                   | PDまで        | デキサート                | 16.5 mg/body                        | 点滴                     | 1,8,15,22       | 1-2コース                 |                   |           |         |
|                            |                       |             | ダラザレックス              | 16 mg/kg                            | 点滴                     | 1,8,15,22       | 1-2コース                 |                   |           |         |
|                            |                       |             | レブラミド                | 25 mg/body                          | 経口                     | 1-21            | 1-2コース                 |                   |           |         |
|                            |                       |             | レナデックス(デカドロン)        | 20 mg/body                          | 経口                     | 2,9,16,23       | 1-2コース                 |                   |           |         |
|                            |                       |             | デキサート                | 16.5 mg/body                        | 点滴                     | 1,15            | 3-6コース                 |                   |           |         |
|                            |                       |             | ダラザレックス              | 16 mg/kg                            | 点滴                     | 1,15            | 3-6コース                 |                   |           |         |
|                            |                       |             | レブラミド                | 25 mg/body                          | 経口                     | 1-21            | 3-6コース                 |                   |           |         |
|                            |                       |             | レナデックス(デカドロン)        | 20 mg/body                          | 経口                     | 2,16            | 3-6コース                 |                   |           |         |
|                            |                       |             |                      | 40 mg/body                          | 経口                     | 9,23            | 3-6コース                 |                   |           |         |
|                            |                       |             | デキサート                | 16.5 mg/body                        | 点滴                     | 1               | 7コース以降                 |                   |           |         |
|                            |                       |             | ダラザレックス              | 16 mg/kg                            | 点滴                     | 1               | 7コース以降                 |                   |           |         |
|                            |                       |             | レブラミド                | 25 mg/body                          | 経口                     | 1-21            | 7コース以降                 |                   |           |         |
|                            |                       |             | レナデックス(デカドロン)        | 20 mg/body                          | 経口                     | 2               | 7コース以降                 |                   |           |         |
|                            |                       |             |                      | 40 mg/body                          | 経口                     | 9,16,23         | 7コース以降                 |                   |           |         |
|                            |                       |             | 【MM】BOR+DEX+DAR      | 21日                                 | PDまで(9コース目から4週1コース)    | ベルケイド           | 1.3 mg/m <sup>2</sup>  | 皮下注               | 1,4,8,11  | 1-3コース  |
| デキサート                      | 16.5 mg/body          | 点滴          |                      |                                     |                        | 1,8,15          | 1-3コース                 |                   |           |         |
| ダラザレックス                    | 16 mg/kg              | 点滴          |                      |                                     |                        | 1,8,15          | 1-3コース                 |                   |           |         |
| レナデックス(デカドロン)              | 20 mg/body            | 経口          |                      |                                     |                        | 2,4,5,9,11,12   | 1-3コース                 |                   |           |         |
| ベルケイド                      | 1.3 mg/m <sup>2</sup> | 皮下注         |                      |                                     |                        | 1,4,8,11        | 4-8コース                 |                   |           |         |
| デキサート                      | 16.5 mg/body          | 点滴          |                      |                                     |                        | 1               | 4-8コース                 |                   |           |         |
| ダラザレックス                    | 16 mg/kg              | 点滴          |                      |                                     |                        | 1               | 4-8コース                 |                   |           |         |
| レナデックス(デカドロン)              | 20 mg/body            | 経口          |                      |                                     |                        | 2,4,5,8,9,11,12 | 4-8コース                 |                   |           |         |
| デキサート                      | 16.5 mg/body          | 点滴          |                      |                                     |                        | 1               | 9コース以降                 |                   |           |         |
| ダラザレックス                    | 16 mg/kg              | 点滴          |                      |                                     |                        | 1               | 9コース以降                 |                   |           |         |
| 【MM】high dose L-PAM        | 28日                   | 1コース        |                      |                                     |                        | アルケラン           | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                | 1,2       |         |
| 【MM】DEX+ELO+POMA           | 28日                   | PDまで        |                      |                                     |                        | エムプリシティ         | 10 mg/kg               | 点滴                | 1,8,15,22 | 2コース目まで |
|                            |                       |             |                      | 20 mg/kg                            | 点滴                     | 1               | 3コース目以降                |                   |           |         |
|                            |                       |             | ポマリスト                | 4 mg/body                           | 経口                     | 1-21            |                        |                   |           |         |
|                            |                       |             | デキサート                | 33 mg/body                          | 点滴                     | ELO投与日          | 75歳超は<br>16.5mg/body   |                   |           |         |
|                            |                       |             | レナデックス(デカドロン)        | 40 mg/body                          | 経口                     | 8,15,22         | 3コース目以降、75歳超は20mg/body |                   |           |         |
| 【MM】DEX+CAR_once weekly    | 28日                   | PDまで        | デキサート                | 33 mg/body                          | 点滴                     | 1,8,15          |                        |                   |           |         |
|                            |                       |             | レナデックス(デカドロン)        | 40 mg/body                          | 経口                     | 22              | (原則9コース目まで)            |                   |           |         |
|                            |                       |             | カイプロリス               | 20 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴                     | 1               | 1コース目                  |                   |           |         |
|                            |                       |             |                      | 70 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴                     | 8,15            | 1コース目                  |                   |           |         |
|                            |                       |             | 70 mg/m <sup>2</sup> | 点滴                                  | 1,8,15                 | 2コース目以降         |                        |                   |           |         |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名                           | 1コースの日数    | 予定コース数                  | 使用抗がん薬            | 投与量                   | 投与方法 | 投与日                  |                               |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------|----------------------|-------------------------------|
| 【MM】IPd (ISA+POMA+DEX)          | 28日        | PDまで                    | サークリサ             | 10 mg/kg              | 点滴   | 1,8,15,22            | 1コース目                         |
|                                 |            |                         |                   | 10 mg/kg              | 点滴   | 1,15                 | 2コース目以降                       |
|                                 |            |                         | デキサート             | 33 mg/body            | 点滴   | ISA投与日               | 75歳以上は<br>16.5mg/body         |
|                                 |            |                         | レナデックス(デカドロン)     | 40 mg/body            | 経口   | 8,22                 | 2コース目以降、75歳以上は20mg/body       |
|                                 |            |                         | ボマリスト             | 4 mg/body             | 経口   | 1-21                 |                               |
| 【MM】DLd (DAR皮下注+LEN+DEX)        | 28日        | PDまで                    | ダラキユーロ            | 15 mL                 | 皮下注  | 1,8,15,22            | 1-2コース目                       |
|                                 |            |                         |                   | 15 mL                 | 皮下注  | 1,15                 | 3-6コース目                       |
|                                 |            |                         |                   | 15 mL                 | 皮下注  | 1                    | 7コース目以降                       |
|                                 |            |                         | レブラミド             | 25 mg/body            | 経口   | 1-21                 | 投与量調節可                        |
|                                 |            |                         | デカドロン             | 20 mg/body            | 経口   | 2,9,16,23            | 1-2コース目                       |
|                                 |            |                         |                   | 20 mg/body            | 経口   | 2,8,9,16,22,23       | 3-6コース目                       |
|                                 | 20 mg/body | 経口                      | 2,8,9,15,16,22,23 | 7コース目以降               |      |                      |                               |
| 【MM】DBd (DAR皮下注+BOR+DEX)        | 21日        | PDまで(9コース目以降は28日/1コース)  | ダラキユーロ            | 15 mL                 | 皮下注  | 1,8,15               | 1-3コース目                       |
|                                 |            |                         |                   | 15 mL                 | 皮下注  | 1                    | 4-8コース目                       |
|                                 |            |                         |                   | 15 mL                 | 皮下注  | 1                    | 9コース目以降                       |
|                                 |            |                         | ベルケイド             | 1.3 mg/m <sup>2</sup> | 皮下注  | 1,4,8,11             | 1-8コース目                       |
|                                 |            |                         | デカドロン(レナデックス)     | 20 mg/body            | 経口   | 2,4,5,9,11,12        | 1-3コース目                       |
|                                 | 20 mg/body | 経口                      | 2,4,5,8,9,11,12   | 4-8コース目               |      |                      |                               |
| 【MM】DCd (DAR皮下注+CAR+DEX)        | 28日        |                         | ダラキユーロ            | 15 mL                 | 皮下注  | 1,8,15,22            | 1-2コース目                       |
|                                 |            |                         |                   | 15 mL                 | 皮下注  | 1,15                 | 3-6コース目                       |
|                                 |            |                         |                   | 15 mL                 | 皮下注  | 1                    | 7コース目以降                       |
|                                 |            |                         | カイプロリス            | 20 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,2                  | 1コース目                         |
|                                 |            |                         |                   | 56 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 8,9,15,16            | 1コース目                         |
|                                 |            |                         |                   | 56 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,2,8,9,15,16        | 2コース目以降                       |
| 【MM】DPd (DAR皮下注+POMA+DEX)       | 28日        | PDまで                    | ダラキユーロ            | 15 mL                 | 皮下注  | 1,8,15,22            | 1-2コース目                       |
|                                 |            |                         |                   | 15 mL                 | 皮下注  | 1,15                 | 3-6コース目                       |
|                                 |            |                         |                   | 15 mL                 | 皮下注  | 1                    | 7コース目以降                       |
|                                 |            |                         | ボマリスト             | 4 mg/body             | 経口   | 1-21                 | 適宜減量 分1                       |
| 【MM】Id (ISA+DEX)                | 28日        | PDまで                    | サークリサ             | 20 mg/kg              | 点滴   | 1,8,15,22            | 1コース目                         |
|                                 |            |                         |                   | 20 mg/kg              | 点滴   | 1,15                 | 2コース目以降                       |
|                                 |            |                         | デキサート             | 33 mg/body            | 点滴   | ISA投与日               | 75歳以上は<br>16.5mg/body         |
|                                 |            |                         | レナデックス(デカドロン)     | 40 mg/body            | 経口   | 8,22                 | 2コース目以降 (75歳以上は<br>20mg/body) |
|                                 |            |                         |                   |                       |      |                      |                               |
| 【MM】IKd (ISA+CAR+DEX)           | 28日        | PDまで                    | サークリサ             | 10 mg/kg              | 点滴   | 1,8,15,22            | 1コース目                         |
|                                 |            |                         |                   | 10 mg/kg              | 点滴   | 1,15                 | 2コース目以降                       |
|                                 |            |                         | カイプロリス            | 20 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,2                  | 1コース目                         |
|                                 |            |                         |                   | 56 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 8,9,15,16            | 1コース目                         |
|                                 |            |                         |                   | 56 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,2,8,9,15,16        | 2コース目以降                       |
|                                 |            |                         | レナデックス(デカドロン)     | 20 mg/body            | 経口   | 23                   | 1コース目                         |
|                                 | 20 mg/body | 経口                      | 22,23             | 2コース目以降               |      |                      |                               |
| 【MM】DMPB (DAR皮下注+BOR+DEX+L-PAM) | 42日        | PDまで(10コース目以降は28日/1コース) | ダラキユーロ            | 15 mL                 | 皮下注  | 1,8,15,22,29,36      | 1コース目                         |
|                                 |            |                         |                   | 15 mL                 | 皮下注  | 1,22                 | 2-9コース目                       |
|                                 |            |                         |                   | 15 mL                 | 皮下注  | 1                    | 10コース目以降                      |
|                                 |            |                         | ベルケイド             | 1.3 mg/m <sup>2</sup> | 皮下注  | 1,4,8,11,22,25,29,32 | 1コース目                         |
|                                 |            |                         |                   | 1.3 mg/m <sup>2</sup> | 皮下注  | 1,8,22,29            | 2-9コース目                       |
|                                 |            |                         | アルケラン             | 9 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-4                  | 1-9コース目                       |
|                                 |            |                         | ブレドニン             | 60 mg/m <sup>2</sup>  | 経口   | 2-4                  | 1-9コース目                       |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名                   | 1コースの日数 | 予定コース数                            | 使用抗がん薬        | 投与量                   | 投与方法 | 投与日       |                         |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------|-----------|-------------------------|
| <b>造血器他</b>             |         |                                   |               |                       |      |           |                         |
| 【ATL】mLSG15 (①VCAP)     | 7日      | 6コース                              | オンコピン         | 1 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1         | 最大2mg/body              |
|                         |         |                                   | ドキソルビシン       | 40 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1         |                         |
|                         |         |                                   | エンドキサン        | 350 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1         |                         |
|                         |         |                                   | プレドニン         | 40 mg/m <sup>2</sup>  | 経口   | 1         |                         |
| 【ATL】mLSG15 (②AMP)      | 7日      | 6コース                              | ドキソルビシン       | 30 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1         |                         |
|                         |         |                                   | サイメリン         | 60 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1         |                         |
|                         |         |                                   | プレドニン         | 40 mg/m <sup>2</sup>  | 経口   | 1         |                         |
| 【ATL】mLSG15 (③VECP)     | 7日      | 6コース                              | フィルデシン        | 2.4 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1         |                         |
|                         |         |                                   | エトポシド         | 100 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1-3       |                         |
|                         |         |                                   | カルボプラチン       | 250 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1         |                         |
|                         |         |                                   | プレドニン         | 40 mg/m <sup>2</sup>  | 経口   | 1-3       |                         |
| 【ATL】MOG                | 7日      | 8コース                              | ボテリジオ         | 1 mg/kg               | 点滴   | 1         |                         |
| 【ATL】MOG+mLSG15 (①VCAP) | 7日      | 4コース (VCAP<br>→AMP→VECP<br>を4週ごと) | ボテリジオ         | 1 mg/kg               | 点滴   | ◆         | 1コース目 : day2, 以降 : day0 |
|                         |         |                                   | オンコピン         | 1 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1         | 最大2mg/body              |
|                         |         |                                   | ドキソルビシン       | 40 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1         |                         |
|                         |         |                                   | エンドキサン        | 350 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1         |                         |
|                         |         |                                   | プレドニン         | 40 mg/m <sup>2</sup>  | 経口   | 1         |                         |
| 【ATL】MOG+mLSG15 (②AMP)  | 7日      | 4コース (VCAP<br>→AMP→VECP<br>を4週ごと) | ドキソルビシン       | 30 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1         |                         |
|                         |         |                                   | サイメリン         | 60 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1         |                         |
|                         |         |                                   | プレドニン         | 40 mg/m <sup>2</sup>  | 経口   | 1         |                         |
| 【ATL】MOG+mLSG15 (③VECP) | 14日     | 4コース (VCAP<br>→AMP→VECP<br>を4週ごと) | ボテリジオ         | 1 mg/kg               | 点滴   | 1         |                         |
|                         |         |                                   | フィルデシン        | 2.4 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 2         |                         |
|                         |         |                                   | エトポシド         | 100 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 2-4       |                         |
|                         |         |                                   | カルボプラチン       | 250 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 2         |                         |
|                         |         |                                   | プレドニン         | 40 mg/m <sup>2</sup>  | 経口   | 2-4       |                         |
| 【アミロイドーシス】DCyBorD       | 28日     | 6コース→以降<br>DAR皮下注で18<br>コース       | ダラキューロ        | 15 mL                 | 皮下注  | DAR投与日    |                         |
|                         |         |                                   | エンドキサン        | 300 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,8,15,22 | 6コースまで (上限<br>500mg)    |
|                         |         |                                   | ベルケイド         | 1.3 mg/m <sup>2</sup> | 皮下注  | 1,8,15,22 | 6コースまで                  |
|                         |         |                                   | デキサート         | 16.5 mg/body          | 点滴   | 1,8,15,22 | 6コースまで                  |
| <b>原発不明</b>             |         |                                   |               |                       |      |           |                         |
| 【原発不明】Nivo              | 日       | PDまで                              | オブジーボ(2週1コース) | 240 mg/body           | 点滴   | 1         |                         |
|                         |         |                                   | オブジーボ(4週1コース) | 480 mg/body           | 点滴   | 1         |                         |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名  | 1コースの日数 | 予定コース数      | 使用抗がん薬                             | 投与量                    | 投与方法                | 投与日       |                                      |    |                             |            |
|--|---------|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|----|-----------------------------|------------|
| <b>小児固形腫瘍</b>                                    |         |             |                                    |                        |                     |           |                                      |    |                             |            |
| 【小児Wilms腫瘍】EE-4A (ACT-D+VCR)                     | 7日      | 完遂まで(計126日) | コスメゲン(A)                           | 0.045 mg/kg            | 静注                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             |                                    | 1.35 mg/m <sup>2</sup> | 静注                  | 1         | 30kg以上                               |    |                             |            |
|  |         |             | オンコビン(V)                           | 0.05 mg/kg             | 静注                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             |                                    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注                  | 1         | 30kg以上                               |    |                             |            |
|  |         |             | オンコビン(V1)                          | 0.067 mg/kg            | 静注                  | 1         |                                      |    |                             |            |
| 【小児Wilms腫瘍】DD-4A (ACT-D+VCR+DXR)                 | 7日      | 完遂まで(計168日) | コスメゲン(A)                           | 0.045 mg/kg            | 静注                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             |                                    | 1.35 mg/m <sup>2</sup> | 静注                  | 1         | 30kg以上                               |    |                             |            |
|  |         |             | オンコビン(V)                           | 0.05 mg/kg             | 静注                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             |                                    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注                  | 1         | 30kg以上                               |    |                             |            |
|  |         |             | オンコビン(V1)                          | 0.067 mg/kg            | 静注                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             |                                    | 2 mg/m <sup>2</sup>    | 静注                  | 1         | 30kg以上                               |    |                             |            |
|  |         |             | ドキシソルビシン(D1)                       | 1.5 mg/kg              | 静注                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             |                                    | 45 mg/m <sup>2</sup>   | 静注                  | 1         | 30kg以上                               |    |                             |            |
|  |         |             | ドキシソルビシン(D2)                       | 1 mg/kg                | 静注                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             |                                    | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 静注                  | 1         | 30kg以上                               |    |                             |            |
| 【小児Wilms腫瘍】Regimen I (VCR+DXR+CPA+VP-16)         | 7日      | 完遂まで(計168日) | オンコビン(V)                           | 0.05 mg/kg             | 静注                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             |                                    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注                  | 1         | 30kg以上                               |    |                             |            |
|  |         |             | オンコビン(V1)                          | 0.067 mg/kg            | 静注                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             |                                    | 2 mg/m <sup>2</sup>    | 静注                  | 1         | 30kg以上                               |    |                             |            |
|  |         |             | ドキシソルビシン(D1)                       | 1.5 mg/kg              | 静注                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             |                                    | 45 mg/m <sup>2</sup>   | 静注                  | 1         | 30kg以上                               |    |                             |            |
|  |         |             | エンドキサン(C1)                         | 14.7 mg/kg             | 点滴                  | 1-3       |                                      |    |                             |            |
|  |         |             |                                    | 440 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                  | 1-3       | 30kg以上                               |    |                             |            |
|  |         |             | エンドキサン(C2)                         | 14.7 mg/kg             | 点滴                  | 1-5       |                                      |    |                             |            |
|  |         |             |                                    | 440 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                  | 1-5       | 30kg以上                               |    |                             |            |
|  |         |             | エトポシド(E2)                          | 3.3 mg/kg              | 点滴                  | 1-5       |                                      |    |                             |            |
|  |         |             |                                    | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                  | 1-5       | 30kg以上                               |    |                             |            |
| 【小児髄芽腫】Packer B (CDDP+VCR+CPA)                   | 28日     | 8コース        | シスプラチン                             | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | オンコビン                              | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                  | 2,8,15    | 最大2mg/body                           |    |                             |            |
|  |         |             | エンドキサン                             | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴                  | 22,23     |                                      |    |                             |            |
| 【小児髄芽腫】St Jude Medulloblastoma-96 (CDDP+VCR+CPA) | 11日     |             | シスプラチン                             | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | オンコビン                              | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                  | 1,11      |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | エンドキサン                             | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴                  | 2,3       |                                      |    |                             |            |
| 【小児髄芽腫】TEMRI (TMZ+CPT-11)                        | 21日     | 6コース        | テモダール                              | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                  | 1-5       | 2コース目以降<br>125mg/m <sup>2</sup> に増量可 |    |                             |            |
|  |         |             | イリノテカン                             | 10 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                  | 1-5, 8-12 |                                      |    |                             |            |
| 【小児神経芽腫】乳児神経芽腫プロトコール Regimen A                   | 14日     | 最長12コース     | オンコビン                              | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注                  | 1         | 最大2mg/body                           |    |                             |            |
|  |         |             | エンドキサン                             | 300 mg/m <sup>2</sup>  | 静注                  | 8         | 点滴も可                                 |    |                             |            |
| 【小児上衣腫】3歳未満上衣腫プロトコール(UKCCSG/SIOP)                | 56日     | 7コース        | オンコビン(体重≤10kg)                     | 0.05 mg/kg             | 静注                  | 1,15,29   | 最大2mg/body                           |    |                             |            |
|  |         |             | カルボプラチン(体重≤10kg)                   | 20 mg/kg               | 静注                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | メソトレキセート(体重≤10kg)                  | 250 mg/kg              | 点滴                  | 15        |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | エンドキサン(体重≤10kg)                    | 50 mg/kg               | 点滴                  | 29        |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | シスプラチン(体重≤10kg)                    | 1.3 mg/kg              | 点滴                  | 43,44     |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | オンコビン(体重>10kg)                     | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注                  | 1,15,29   | 最大2mg/body                           |    |                             |            |
|  |         |             | カルボプラチン(体重>10kg)                   | 550 mg/m <sup>2</sup>  | 静注                  | 1         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | メソトレキセート(体重>10kg)                  | 8000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴                  | 15        |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | エンドキサン(体重>10kg)                    | 1500 mg/m <sup>2</sup> | 点滴                  | 29        |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | シスプラチン(体重>10kg)                    | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                  | 43,44     |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | 【小児神経膠腫】VCR+CBDCA (① Introduction) | 84日                    | 1コース→治療反応性良好なら維持療法へ | オンコビン     | 1.5 mg/m <sup>2</sup>                | 静注 | 1,8,15,22,29,36,43,50,57,64 | 最大2mg/body |
|  |         |             |                                    |                        |                     | カルボプラチン   | 175 mg/m <sup>2</sup>                | 点滴 | 1,8,15,22,43,50,57,64       |            |
| 【小児神経膠腫】VCR+CBDCA (② Maintenance)                | 42日     | 12コース       | オンコビン                              | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注                  | 1,8,15    | 最大2mg/body                           |    |                             |            |
|  |         |             | カルボプラチン                            | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                  | 1,8,15,22 |                                      |    |                             |            |
| 【小児髄芽腫/PNET】Regimen A: VP-16+CPA+VCR+CDDP        | 28日     | 「特記事項」参照    | エトポシド                              | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴                  | 1,2,3,4,5 |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | エンドキサン                             | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴                  | 1, 3, 5   |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | シスプラチン                             | 90 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴                  | 2         |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | オンコビン                              | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注                  | 1         | 最大2.0mg/body                         |    |                             |            |
|  |         |             | メソトレキセート                           | 12 mg/body             | 髄注                  | 1,(8)     |                                      |    |                             |            |
|  |         |             | デキササート                             | 8 mg/body              | 髄注                  | 1,(8)     |                                      |    |                             |            |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名                                     | 1コースの日数 | 予定コース数                 | 使用抗がん薬   | 投与量                    | 投与方法 | 投与日      |                         |
|---|---------|------------------------|----------|------------------------|------|----------|-------------------------|
| 【小児髄芽腫/PNET】Regimen B: CPA+VCR+CDDP       | 28日     | 「特記事項」参照               | エンドキサン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1, 3, 5  |                         |
|   |         |                        | シスプラチン   | 90 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 2        |                         |
|   |         |                        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注   | 1        | 最大2.0mg/body            |
|   |         |                        | メソトレキセート | 12 mg/body             | 髄注   | 1        |                         |
|   |         |                        | デキサート    | 8 mg/body              | 髄注   | 1        |                         |
| 【小児胚細胞】JEB (VP-16+CBDCA+BLM)              | 21日     | 腫瘍マーカー陰性化/腫瘍縮小から2コース追加 | エトポシド    | 120 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-3      |                         |
|   |         |                        | カルボプラチン  | 600 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 2        |                         |
|   |         |                        | プレオ      | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 3        |                         |
| 【小児神経芽腫】神経芽腫プロトコール05A1 (VCR+CPA+THP+CDDP) | 28日     | 1コース                   | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1        | Max2.0mg/body           |
|   |         |                        | エンドキサン   | 1200 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1        |                         |
|   |         |                        | テラルビシン   | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 3        |                         |
|   |         |                        | シスプラチン   | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-5      | 総量100mg/m <sup>2</sup>  |
| 【小児神経芽腫】神経芽腫プロトコール05A3 (VCR+CPA+THP+CDDP) | 28日     | 2コース                   | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1        | Max2.0mg/body           |
|   |         |                        | エンドキサン   | 1200 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1,2      | 総量2400mg/m <sup>2</sup> |
|   |         |                        | テラルビシン   | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 3        |                         |
|   |         |                        | シスプラチン   | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-5      | 総量100mg/m <sup>2</sup>  |
| 【小児神経芽腫】神経芽腫プロトコールICE (CBDCA+IFM+VP-16)   | 28日     | 2コース                   | カルボプラチン  | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,2      | 合計800mg/m <sup>2</sup>  |
|   |         |                        | イホマイド    | 1800 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1-5      | 合計9000mg/m <sup>2</sup> |
|   |         |                        | エトポシド    | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5      | 合計500mg/m <sup>2</sup>  |
| 【小児神経芽腫】神経芽腫プロトコールTC (NGT+CPA)            | 28日     | 2コース                   | ハイカムチン   | 0.75 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1-5      | 総量3.75mg/m <sup>2</sup> |
|   |         |                        | エンドキサン   | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5      | 総量1250mg/m <sup>2</sup> |
| 【小児神経芽腫】神経芽腫プロトコールTI (TMZ+CPT-11)         | 28日     | 4コース                   | テモダール    | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5      | 総量500mg/m <sup>2</sup>  |
|   |         |                        | イリノテカン   | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-5、8-12 | 総量200mg/m <sup>2</sup>  |

### 小児骨軟部肉腫

|  |     |                    |          |                         |    |     |   |
|--|-----|--------------------|----------|-------------------------|----|-----|---|
| 【小児骨肉腫】JCOG0905 CDDP+DXR                         | 21日 |                    | シスプラチン   | 120 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴 | 1   |   |
|  |     |                    | ドキシソルビシン | 30 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴 | 1,2 |   |
| 【小児骨肉腫】JCOG0905 high-dose MTX                    | 7日  |                    | メソトレキセート | 12000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴 | 1   |   |
| 【小児Ewing肉腫】intensified VDC/IE (VDC: VCR+CPA+DXR) | 14日 | 7コース(6コース以降はDXRなし) | オンコビン    | 2 mg/m <sup>2</sup>     | 点滴 | 1   | 最大2mg/body  |
|  |     |                    | エンドキサン   | 1200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴 | 1   |   |
|  |     |                    | ドキシソルビシン | 37.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴 | 1,2 |   |
|  |     |                    | ※ウロミテキサン | 720 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴 | 1   | 1回240mg/m <sup>2</sup>                            |
| 【小児Ewing肉腫】intensified VDC/IE (IE: VP-16+IFM)    | 14日 | 7コース(6コース以降はDXRなし) | エトポシド    | 100 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴 | 1-5 |   |
|  |     |                    | イホマイド    | 1800 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴 | 1-5 |   |
|  |     |                    | ※ウロミテキサン | 1080 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴 | 1-5 | 1回360mg/m <sup>2</sup>                            |
|  |     |                    | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴 | 1   | 最大2mg/body  |
| 【小児Ewing肉腫】intensified VDC/IE (VC: VCR+CPA)      | 14日 | 7コース(6コース以降はDXRなし) | エンドキサン   | 1200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴 | 1   |   |
|  |     |                    | ※ウロミテキサン | 720 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴 | 1   | 1回240mg/m <sup>2</sup>                            |
|  |     |                    | イホマイド    | 2650 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴 | 1-3 | =8 × [(0.93 × GFR (mL/min/m <sup>2</sup> )) + 15] |
| 【小児骨肉腫】OS99 trial (CBDCA+IFM)                    | 21日 | 特記事項参照             | カルボプラチン  | 8 AUC                   | 点滴 | 1   | =8 × [(0.93 × GFR (mL/min/m <sup>2</sup> )) + 15] |
| 【小児骨肉腫】OS99 trial (week 9 DXR)                   | 21日 | 特記事項参照             | ドキシソルビシン | 25 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴 | 1-3 |   |
| 【小児骨肉腫】OS99 trial (IFM+DXR)                      | 21日 | 特記事項参照             | イホマイド    | 2650 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴 | 1-3 |   |
|  |     |                    | ドキシソルビシン | 25 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴 | 1,2 |   |
| 【小児骨肉腫】OS99 trial (CBDCA+DXR)                    | 21日 | 特記事項参照             | カルボプラチン  | 8 AUC                   | 点滴 | 1   | =8 × [(0.93 × GFR (mL/min/m <sup>2</sup> )) + 15] |
|  |     |                    | ドキシソルビシン | 25 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴 | 1,2 |   |
|  |     |                    | ドキシソルビシン | 37.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴 | 1,2 |   |
| 【小児骨肉腫】EURAMOS-1 DXR+CDDP                        | 21日 |                    | シスプラチン   | 60 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴 | 1,2 |   |
| 【小児骨肉腫】EURAMOS-1 high-dose MTX                   | 7日  |                    | メソトレキセート | 12000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴 | 1   | Max20 g/body                                      |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません



| レジメン名  | 1コースの日数 | 予定コース数 | 使用抗がん薬       | 投与量                    | 投与方法 | 投与日               |              |
|--|---------|--------|--------------|------------------------|------|-------------------|--------------|
| <b>小児血液</b>  |         |        |              |                        |      |                   |              |
| 【小児白血病】JACLS SR-02 ①(early phase) induction therapy week 1-5 | 35日     |        | オンコピン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 8,15,22,29        | 最大2.0mg/body |
|  |         |        | ダウノマイシン      | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 8,9               |              |
|  |         |        | ロイナーゼ        | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 15,17,19,22,24,26 |              |
|  |         |        | (体重)オンコピン    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 8,15,22,29        | 最大2.0mg/body |
|  |         |        | (体重)ダウノマイシン  | 1 mg/kg                | 中心静脈 | 8,9               |              |
|  |         |        | (体重)ロイナーゼ    | 200 U/kg               | 中心静脈 | 15,17,19,22,24,26 |              |
| 【小児白血病】JACLS SR-02 ② consolidation therapy week 6-8          | 21日     |        | キロサイド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-5               |              |
|  |         |        | エンドキサン       | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1,3,5             |              |
|  |         |        | (体重)キロサイド    | 3.3 mg/kg              | 中心静脈 | 1-5               |              |
|  |         |        | (体重)エンドキサン   | 16.6 mg/kg             | 中心静脈 | 1,3,5             |              |
|  |         |        |              |                        |      |                   |              |
| 【小児白血病】JACLS SR-02 ③ sanctuary therapy week 9-10             | 14日     |        | メソトレキセート     | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1,8               |              |
|  |         |        | ロイコボリン       | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 3,4 10,11         | 1回量          |
|  |         |        | (体重)メソトレキセート | 100 mg/kg              | 中心静脈 | 1,8               |              |
|  |         |        | (体重)ロイコボリン   | 0.5 mg/kg              | 点滴   | 3,4 10,11         | 1回量          |
|  |         |        |              |                        |      |                   |              |
| 【小児白血病】JACLS SR-02 ④ reinduction therapy week 11-14          | 28日     |        | オンコピン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15            |              |
|  |         |        | テラルピシン       | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,8               |              |
|  |         |        | ロイナーゼ        | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1,3,5,8,10,12     |              |
|  |         |        | オンコピン(体重)    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1,8,15            |              |
|  |         |        | テラルピシン(体重)   | 0.83 mg/kg             | 中心静脈 | 1,8               |              |
|  |         |        | ロイナーゼ(体重)    | 200 U/kg               | 中心静脈 | 1,3,5,8,10,12     |              |
| 【小児白血病】JACLS SR-02 ⑤ maintenance phase week 18-102           | 28日     | 22コース  | オンコピン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1                 | 最大2.0mg/body |
|  |         |        | (体重)オンコピン    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1                 | 最大2.0mg/body |
|  |         |        |              |                        |      |                   |              |
| 【小児白血病】JACLS HR-02改訂 ① induction therapy week 1-5            | 35日     |        | オンコピン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 8,15,22,29        | 最大2.0mg/body |
|  |         |        | ダウノマイシン      | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 8,9               |              |
|  |         |        | エンドキサン       | 1200 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 10                |              |
|  |         |        | ロイナーゼ        | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 15,17,19,22,24,26 |              |
|  |         |        | (体重)オンコピン    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 8,15,22,29        | 最大2.0mg/body |
|  |         |        | (体重)ダウノマイシン  | 1 mg/kg                | 中心静脈 | 8,9               |              |
|  |         |        | (体重)エンドキサン   | 40 mg/kg               | 中心静脈 | 10                |              |
|  |         |        | (体重)ロイナーゼ    | 200 U/kg               | 中心静脈 | 15,17,19,22,24,26 |              |
| 【小児白血病】JACLS HR-02改訂 ② consolidation therapy week 6-9        | 28日     |        | キロサイド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-5               |              |
|  |         |        | エンドキサン       | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1,3,5             |              |
|  |         |        | テラルピシン       | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,2               |              |
|  |         |        | (体重)キロサイド    | 3.3 mg/kg              | 中心静脈 | 1-5               |              |
|  |         |        | (体重)エンドキサン   | 16.6 mg/kg             | 中心静脈 | 1,3,5             |              |
|  |         |        | (体重)テラルピシン   | 0.83 mg/kg             | 中心静脈 | 1,2               |              |
| 【小児白血病】JACLS HR-02改訂 ③ sanctuary therapy week 10-11          | 14日     |        | (体重)メソトレキセート | 100 mg/kg              | 中心静脈 | 1,8               |              |
|  |         |        | (体重)ロイコボリン   | 0.5 mg/kg              | 点滴   | 3,4 10,11         | 1回量          |
|  |         |        | メソトレキセート     | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1,8               |              |
|  |         |        | ロイコボリン       | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 3,4 10,11         | 1回量          |
| 【小児白血病】JACLS HR-02改訂 ④ reinduction therapy week 12-15        | 28日     |        | オンコピン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15            |              |
|  |         |        | テラルピシン       | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,8               |              |
|  |         |        | エンドキサン       | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1,8               |              |
|  |         |        | ロイナーゼ        | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1,3,5,8,10,12     |              |
|  |         |        | (体重)オンコピン    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1,8,15            |              |
|  |         |        | (体重)テラルピシン   | 0.83 mg/kg             | 中心静脈 | 1,8               |              |
|  |         |        | (体重)エンドキサン   | 16.6 mg/kg             | 中心静脈 | 1,8               |              |
|  |         |        | (体重)ロイナーゼ    | 200 U/kg               | 中心静脈 | 1,3,5,8,10,12     |              |
| 【小児白血病】JACLS HR-02改訂 ⑤ re-consolidation therapy week 16-19   | 28日     |        | キロサイド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-5               |              |
|  |         |        | エンドキサン       | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1,3,5             |              |
|  |         |        | テラルピシン       | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,2               |              |
|  |         |        | (体重)キロサイド    | 3.3 mg/kg              | 中心静脈 | 1-5               |              |
|  |         |        | (体重)エンドキサン   | 16.6 mg/kg             | 中心静脈 | 1,3,5             |              |
|  |         |        | (体重)テラルピシン   | 0.83 mg/kg             | 中心静脈 | 1,2               |              |
| 【小児白血病】JACLS HR-02改訂 ⑥ maintenance phase week 20-25 CNS(-)   | 42日     |        | メソトレキセート     | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,15,29           |              |
|  |         |        | (体重)メソトレキセート | 5 mg/kg                | 点滴   | 1,15,29           |              |
| 【小児白血病】JACLS HR-02改訂 ⑥ maintenance phase week 20-25 CNS(+)   | 42日     |        | メソトレキセート     | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 29                |              |
|  |         |        | (体重)メソトレキセート | 5 mg/kg                | 中心静脈 | 29                |              |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名   | 1コースの日数 | 予定コース数 | 使用抗がん薬       | 投与量                    | 投与方法 | 投与日               |
|---|---------|--------|--------------|------------------------|------|-------------------|
| 【小児白血病】JACLS HR-02改訂 ⑦<br>maintenance phase week 26,46,66,86                | 28日     |        | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15            |
|   |         |        | エンドキサン       | 600 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 8                 |
|   |         |        | ロイナーゼ        | 10000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 1,8,15            |
|   |         |        | (体重)オンコビン    | 0.05 mg/kg             | 静注   | 1,8,15            |
|   |         |        | (体重)エンドキサン   | 20 mg/kg               | 中心静脈 | 8                 |
|   |         |        | (体重)ロイナーゼ    | 333.3 U/kg             | 筋注   | 1,8,15            |
| 【小児白血病】JACLS HR-02改訂 ⑧<br>maintenance phase week 36,56,76,96                | 28日     |        | オンコビン(体重)    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1,8,15            |
|   |         |        | テラルピシン(体重)   | 0.83 mg/kg             | 中心静脈 | 8                 |
|   |         |        | ロイナーゼ(体重)    | 333.3 U/kg             | 筋注   | 1,8,15            |
|   |         |        | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15            |
|   |         |        | テラルピシン       | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 8                 |
|   |         |        | ロイナーゼ        | 10000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 1,8,15            |
| 【小児白血病】JACLS HR-02改訂 ⑨<br>maintenance phase week<br>30,40,50,60,70,80,90    | 42日     |        | メソトレキセート     | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1,15,29           |
|   |         |        | (体重)メソトレキセート | 5 mg/kg                | 中心静脈 | 1,15,29           |
| 【小児白血病】JACLS HR-02 Lなし改訂<br>⑥maintenance phase week 20-28<br>CNS(-)         | 63日     |        | メソトレキセート     | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 静注   | 1,15,29           |
|   |         |        | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注   | 43,50,57          |
|   |         |        | エンドキサン       | 600 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 50                |
|   |         |        | (体重)メソトレキセート | 5 mg/kg                | 静注   | 1,15,29           |
|   |         |        | (体重)オンコビン    | 0.05 mg/kg             | 静注   | 43,50,57          |
|   |         |        | (体重)エンドキサン   | 20 mg/kg               | 中心静脈 | 50                |
| 【小児白血病】JACLS HR-02 Lなし改訂<br>⑥maintenance phase week 20-28<br>CNS(+)         | 63日     |        | メソトレキセート     | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 29                |
|   |         |        | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 43,50,57          |
|   |         |        | エンドキサン       | 600 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 50                |
|   |         |        | (体重)メソトレキセート | 5 mg/kg                | 点滴   | 29                |
|   |         |        | (体重)オンコビン    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 43,50,57          |
|   |         |        | (体重)エンドキサン   | 20 mg/kg               | 中心静脈 | 50                |
| 【小児白血病】JACLS HR-02 Lなし改訂<br>⑦maintenance phase week 46,66,86                | 28日     |        | オンコビン(体重)    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1,8,15            |
|   |         |        | エンドキサン(体重)   | 20 mg/kg               | 中心静脈 | 8                 |
|   |         |        | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15            |
|   |         |        | エンドキサン       | 600 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 8                 |
| 【小児白血病】JACLS HR-02 Lなし改訂<br>⑧maintenance phase week 36,56,76,96             | 28日     |        | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15            |
|   |         |        | テラルピシン       | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 8                 |
|   |         |        | オンコビン(体重)    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1,8,15            |
|   |         |        | テラルピシン(体重)   | 0.83 mg/kg             | 中心静脈 | 8                 |
| 【小児白血病】JACLS HR-02 Lなし改訂<br>⑨maintenance phase week<br>30,40,50,60,70,80,90 | 42日     |        | メソトレキセート     | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1,15,29           |
|   |         |        | (体重)メソトレキセート | 5 mg/kg                | 中心静脈 | 1,15,29           |
| 【小児白血病】JACLS ER-02改訂 ①<br>induction therapy week 1-5                        | 35日     |        | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 8,15,22,29        |
|   |         |        | ダウノマイシン      | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 8,9               |
|   |         |        | エンドキサン       | 1200 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 10                |
|   |         |        | ロイナーゼ        | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 15,17,19,22,24,26 |
|   |         |        | (体重)オンコビン    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 8,15,22,29        |
|   |         |        | (体重)ダウノマイシン  | 1 mg/kg                | 中心静脈 | 8,9               |
|   |         |        | (体重)エンドキサン   | 40 mg/kg               | 中心静脈 | 10                |
|   |         |        | (体重)ロイナーゼ    | 200 U/kg               | 中心静脈 | 15,17,19,22,24,26 |
| 【小児白血病】JACLS ER-02改訂 ②<br>early intensification week 6-9, 14-17,<br>22-25   | 28日     |        | エトポシド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-5               |
|   |         |        | キロサイド        | 300 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-5               |
|   |         |        | テラルピシン       | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 2,4               |
|   |         |        | エンドキサン       | 1200 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 3                 |
|   |         |        | (体重)エトポシド    | 3.3 mg/kg              | 中心静脈 | 1-5               |
|   |         |        | (体重)キロサイド    | 10 mg/kg               | 中心静脈 | 1-5               |
|   |         |        | (体重)テラルピシン   | 0.83 mg/kg             | 中心静脈 | 2,4               |
|   |         |        | (体重)エンドキサン   | 40 mg/kg               | 中心静脈 | 3                 |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注)臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名  | 1コースの日数    | 予定コース数 | 使用抗がん薬        | 投与量                    | 投与方法 | 投与日           |                            |
|--|------------|--------|---------------|------------------------|------|---------------|----------------------------|
| 【小児白血病】JACLS ER-02改訂 ③<br>consolidation therapyA week 10-13, 18-21     | 28日        |        | オンコビン         | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8           | 最大2.0mg/body               |
|  |            |        | メソトレキセート      | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1             |                            |
|  |            |        | ※ロイコボリン       | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 3-4           | 15mg/m <sup>2</sup> × 計6回  |
|  |            |        | テラルピシン        | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 4             |                            |
|  |            |        | キロサイド         | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 4-6           | 1回量                        |
|  |            |        | ロイナーゼ         | 20000 U/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 6             |                            |
|  |            |        | オンコビン(体重)     | 0.05 mg/kg             | 静注   | 1,8           | 最大2.0mg/body               |
|  |            |        | メソトレキセート(体重)  | 100 mg/kg              | 中心静脈 | 1             |                            |
|  |            |        | ※ロイコボリン(体重)   | 0.5 mg/kg              | 点滴   | 3-4           | 0.5mg/m <sup>2</sup> × 計6回 |
|  |            |        | テラルピシン(体重)    | 0.83 mg/kg             | 中心静脈 | 4             |                            |
|  |            |        | キロサイド(体重)     | 66.6 mg/kg             | 中心静脈 | 4-6           | 1回量                        |
| ロイナーゼ(体重)  | 666.6 U/kg | 中心静脈   | 6             |                        |      |               |                            |
| 【小児白血病】JACLS ER-02改訂 ④re-<br>induction therapy week 26-29              | 28日        |        | オンコビン         | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15        |                            |
|  |            |        | テラルピシン        | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,8           |                            |
|  |            |        | エンドキサン        | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1,8           |                            |
|  |            |        | ロイナーゼ         | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1,3,5,8,10,12 |                            |
|  |            |        | (体重)オンコビン     | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1,8,15        |                            |
|  |            |        | (体重)テラルピシン    | 0.83 mg/kg             | 中心静脈 | 1,8           |                            |
|  |            |        | (体重)エンドキサン    | 16.6 mg/kg             | 中心静脈 | 1,8           |                            |
| (体重)ロイナーゼ  | 200 U/kg   | 中心静脈   | 1,3,5,8,10,12 |                        |      |               |                            |
| 【小児白血病】JACLS ER-02改訂 ⑤<br>maintenance phase week 30-35 CNS(-)          | 42日        |        | メソトレキセート      | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,15,29       |                            |
|  |            |        | (体重)メソトレキセート  | 5 mg/kg                | 点滴   | 1,15,29       |                            |
| 【小児白血病】JACLS ER-02改訂 ⑤<br>maintenance phase week 30-35 CNS(+)          | 42日        |        | メソトレキセート      | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 29            |                            |
|  |            |        | (体重)メソトレキセート  | 5 mg/kg                | 中心静脈 | 29            |                            |
| 【小児白血病】JACLS ER-02改訂 ⑥<br>maintenance phase week 36,56,76,96           | 28日        |        | オンコビン         | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15        |                            |
|  |            |        | エンドキサン        | 600 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 8             |                            |
|  |            |        | ロイナーゼ         | 10000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 1,8,15        |                            |
|  |            |        | (体重)オンコビン     | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1,8,15        |                            |
|  |            |        | (体重)エンドキサン    | 20 mg/kg               | 中心静脈 | 8             |                            |
| (体重)ロイナーゼ  | 333.3 U/kg | 筋注     | 1,8,15        |                        |      |               |                            |
| 【小児白血病】JACLS ER-02改訂 ⑦<br>maintenance phase week 46,66,86,106          | 28日        |        | オンコビン         | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15        |                            |
|  |            |        | ロイナーゼ         | 10000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 1,8,15        |                            |
|  |            |        | テラルピシン        | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 8             |                            |
|  |            |        | オンコビン(体重)     | 0.05 mg/kg             | 静注   | 1,8,15        |                            |
|  |            |        | ロイナーゼ(体重)     | 333.3 U/kg             | 筋注   | 1,8,15        |                            |
|  |            |        | テラルピシン(体重)    | 0.83 mg/kg             | 中心静脈 | 8             |                            |
| 【小児白血病】JACLS ER-02改訂 ⑧<br>maintenance phase week 40,50,60,70,80,90,100 | 42日        |        | メソトレキセート      | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1,15,29       |                            |
|  |            |        | (体重)メソトレキセート  | 5 mg/kg                | 中心静脈 | 1,15,29       |                            |
| 【小児白血病】JACLS F-02 ①re-<br>induction therapy week 6-7                   | 14日        |        | キロサイド         | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-3,8-10      |                            |
|  |            |        | ノバントロン        | 8 mg/m <sup>2</sup>    | 中心静脈 | 1-3           |                            |
|  |            |        | エトポシド         | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 8-10          |                            |
|  |            |        | キロサイド(体重)     | 16.6 mg/kg             | 中心静脈 | 1-3,8-10      |                            |
|  |            |        | ノバントロン(体重)    | 0.26 mg/kg             | 中心静脈 | 1-3           |                            |
|  |            |        | エトポシド(体重)     | 6.6 mg/kg              | 中心静脈 | 8-10          |                            |
| 【小児白血病】JACLS F-02 ②<br>consolidation therapyA week 12,20               | 7日         |        | エトポシド         | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-5           |                            |
|  |            |        | キロサイド         | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-5           |                            |
|  |            |        | ノバントロン        | 4 mg/m <sup>2</sup>    | 中心静脈 | 1-3           |                            |
|  |            |        | エトポシド(体重)     | 3.3 mg/kg              | 中心静脈 | 1-5           |                            |
|  |            |        | キロサイド(体重)     | 3.3 mg/kg              | 中心静脈 | 1-5           |                            |
|  |            |        | ノバントロン(体重)    | 0.13 mg/kg             | 中心静脈 | 1-3           |                            |
| 【小児白血病】JACLS F-02 ③<br>consolidation therapyB week 16,24               | 14日        |        | オンコビン         | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8           | 最大2.0mg/body               |
|  |            |        | メソトレキセート      | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 |               |                            |
|  |            |        | ※ロイコボリン       | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 3-4           | 15mg/m <sup>2</sup> × 計6回  |
|  |            |        | テラルピシン        | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 4             |                            |
|  |            |        | キロサイド         | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 4-6           | 1回量                        |
|  |            |        | ロイナーゼ         | 20000 U/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 6             |                            |
|  |            |        | オンコビン(体重)     | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1,8           | 最大2.0mg/body               |
|  |            |        | メソトレキセート(体重)  | 100 mg/kg              | 中心静脈 |               |                            |
|  |            |        | ※ロイコボリン(体重)   | 0.5 mg/kg              | 静注   | 3-4           | 0.5mg/m <sup>2</sup> × 計6回 |
|  |            |        | テラルピシン(体重)    | 0.83 mg/kg             | 中心静脈 | 4             |                            |
|  |            |        | キロサイド(体重)     | 66.6 mg/kg             | 中心静脈 | 4-6           | 1回量                        |
| ロイナーゼ(体重)  | 666.6 U/kg | 中心静脈   | 6             |                        |      |               |                            |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注)臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名  | 1コースの日数 | 予定コース数 | 使用抗がん薬       | 投与量                    | 投与方法 | 投与日                     |                             |
|--|---------|--------|--------------|------------------------|------|-------------------------|-----------------------------|
| 【小児白血病】JACLS F-02 ④<br>maintenance phase week 28,38,48   | 42日     |        | メソトレキセート     | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,15,29                 |                             |
|  |         |        | (体重)メソトレキセート | 5 mg/kg                | 点滴   | 1,15,29                 |                             |
| 【小児白血病】JACLS F-02 ⑤<br>maintenance phase week 34,54      | 28日     |        | フィルデシン       | 3 mg/m <sup>2</sup>    | 静注   | 1,8,15                  |                             |
|  |         |        | テラルピシン       | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 8                       |                             |
|  |         |        | エトポシド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 8                       |                             |
|  |         |        | フィルデシン(体重)   | 0.1 mg/kg              | 静注   | 1,8,15                  |                             |
|  |         |        | テラルピシン(体重)   | 0.83 mg/kg             | 中心静脈 | 8                       |                             |
|  |         |        | エトポシド(体重)    | 3.3 mg/kg              | 中心静脈 | 8                       |                             |
| 【小児白血病】JACLS F-02 ⑥<br>maintenance phase week 44         | 28日     |        | フィルデシン       | 3 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1,8,15                  |                             |
|  |         |        | テラルピシン       | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 8                       |                             |
|  |         |        | エンドキサン       | 600 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 8                       |                             |
|  |         |        | フィルデシン(体重)   | 0.1 mg/kg              | 点滴   | 1,8,15                  |                             |
|  |         |        | テラルピシン(体重)   | 0.83 mg/kg             | 中心静脈 | 8                       |                             |
|  |         |        | エンドキサン(体重)   | 20 mg/kg               | 中心静脈 | 8                       |                             |
| 【小児白血病】AML99 Down protocol                               | 7日      |        | テラルピシン       | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,2                     |                             |
|  |         |        | キロサイド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-7                     |                             |
|  |         |        | エトポシド        | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 3-5                     |                             |
|  |         |        | テラルピシン(体重)   | 0.833 mg/kg            | 中心静脈 | 1,2                     |                             |
|  |         |        | キロサイド(体重)    | 3.33 mg/kg             | 中心静脈 | 1-7                     |                             |
|  |         |        | エトポシド(体重)    | 5 mg/kg                | 中心静脈 | 3-5                     |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 SR 寛<br>解導入療法 I A2                  | 28日     |        | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15,22               | 最大2.0mg/body                |
|  |         |        | ダウノマイシン      | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,8                     |                             |
|  |         |        | ロイナーゼ        | 5000 U/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 5,8,11,14,17,20,23,26   |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 SR 早<br>期強化療法 I B                   | 42日     |        | エンドキサン       | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1,29                    |                             |
|  |         |        | キロサイド        | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 3-6,10-13,17-20,24-27   |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 SR 強<br>化療法M2                       | 70日     |        | メソトレキセート     | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 8,22,36,50              | ①                           |
|  |         |        |              | 1800 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 8,22,36,50              | ②                           |
|  |         |        | ※ロイコポリン      | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 10,24,38,52             | 15mg/m <sup>2</sup> × 計3回ずつ |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 SR 強<br>化療法M-Down(ダウン症)             | 70日     |        | メソトレキセート     | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 8,22,36,50              | ①                           |
|  |         |        |              | 450 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 8,22,36,50              | ②                           |
|  |         |        | ※ロイコポリン      | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 10-11,24-25,38-39,52-53 | 15mg/m <sup>2</sup> × 計6回ずつ |
|  |         |        | メソトレキセート     | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | (22,36,50)              | MTX2回目以降                    |
|  |         |        |              | 900 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | (22,36,50)              | MTX2回目以降                    |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 SR 再<br>寛解導入療法Ⅲ                     | 35日     |        | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8                     | 最大2.0mg/body                |
|  |         |        | テラルピシン       | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,8                     |                             |
|  |         |        | ロイナーゼ        | 10000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 1,4,8,11                |                             |
|  |         |        | エンドキサン       | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 15                      |                             |
|  |         |        | キロサイド        | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 17-20,24-27             |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 SR (ア-70日<br>ΔB)中間維持療法 IM+VD        | 70日     |        | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,29                    | 最大2.0mg/body                |
|  |         |        |              |                        |      |                         |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 SR (ア-56日<br>ΔB)維持療法 Maintenance+VD | 70日     |        | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,29                    | 最大2.0mg/body                |
|  |         |        |              |                        |      |                         |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 IR 寛解<br>導入療法 I A4                  | 28日     |        | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15,22               | 最大2.0mg/body                |
|  |         |        | ダウノマイシン      | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,8,15,22               |                             |
|  |         |        | ロイナーゼ        | 5000 U/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 5,8,11,14,17,20,23,26   |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 IR (ア-42日<br>A)早期強化療法 I B           | 42日     |        | エンドキサン       | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1,29                    |                             |
|  |         |        | キロサイド        | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 3-6,10-13,17-20,24-27   |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 IR (ア-70日<br>A)強化療法 M5              | 70日     |        | メソトレキセート     | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 8,22,36,50              | ①                           |
|  |         |        |              | 4500 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 8,22,36,50              | ②                           |
|  |         |        | ※ロイコポリン      | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 10,24,38,52             | 15mg/m <sup>2</sup> × 計3回ずつ |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 IR 強化<br>療法 M-Down(ダウン症)            | 70日     |        | メソトレキセート     | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 8,22,36,50              | ①                           |
|  |         |        |              | 450 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 8,22,36,50              | ②                           |
|  |         |        | ※ロイコポリン      | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 10-11,24-25,38-39,52-53 | 15mg/m <sup>2</sup> × 計6回ずつ |
|  |         |        | メソトレキセート     | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | (22,36,50)              | MTX2回目以降                    |
|  |         |        |              | 900 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | (22,36,50)              | MTX2回目以降                    |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 IR (ア-70日<br>A)再寛解導入療法Ⅲ             | 35日     |        | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8                     | 最大2.0mg/body                |
|  |         |        | テラルピシン       | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,8                     |                             |
|  |         |        | ロイナーゼ        | 10000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 1,4,8,11                |                             |
|  |         |        | エンドキサン       | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 15                      |                             |
|  |         |        | キロサイド        | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 17-20,24-27             |                             |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注)臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません

| レジメン名   | 1コースの日数 | 予定コース数 | 使用抗がん薬   | 投与量                    | 投与方法 | 投与日                   |                             |
|---|---------|--------|----------|------------------------|------|-----------------------|-----------------------------|
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 IR (7-42日)<br>B) 早期強化療法 I B+L    |         |        | エンドキサン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1,29                  |                             |
|   |         |        | キロサイド    | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 3-6,10-13,17-20,24-27 |                             |
|   |         |        | ロイナーゼ    | 5000 mg/m <sup>2</sup> | 筋注   | 3,6,10,13,17,20,24,27 |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 IR (7-70日)<br>B) 強化療法 M5+L       |         |        | メソトレキセート | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 8,22,36,50            | ①                           |
|   |         |        |          | 4500 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 8,22,36,50            | ②                           |
|   |         |        | ※ロイコボリン  | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 10,24,38,52           | 15mg/m <sup>2</sup> × 計3回ずつ |
|   |         |        | ロイナーゼ    | 12500 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 10,24,38,52           |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 IR (7-35日)<br>B) 再寛解導入療法 III+L   |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8                   | 最大2.0mg/body                |
|   |         |        | テラルピシン   | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,8                   |                             |
|   |         |        | ロイナーゼ    | 10000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 1,4,8,11,15,18,22,25  |                             |
|   |         |        | エンドキサン   | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 15                    |                             |
|   |         |        | キロサイド    | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 17-20,24-27           |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 HR 寛解 28日<br>導入療法 I A4           |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15,22             | 最大2.0mg/body                |
|   |         |        | ダウノマイシン  | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,8,15,22             |                             |
|   |         |        | ロイナーゼ    | 5000 U/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 5,8,11,14,17,20,23,26 |                             |
|   |         |        | エンドキサン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1,29                  |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 HR (7-42日)<br>ΔA) 早期強化療法 I B+L   |         |        | キロサイド    | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 3-6,10-13,17-20,24-27 |                             |
|   |         |        | ロイナーゼ    | 5000 U/m <sup>2</sup>  | 筋注   | 3,6,10,13,17,20,24,27 |                             |
|   |         |        | エンドキサン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1,29                  |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 HR (7-21日)<br>ΔA) 強化療法 HR3       |         |        | キロサイド    | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1,2                   | 1回量                         |
|   |         |        | エトポシド    | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 3-5                   | 1回量                         |
|   |         |        | ロイナーゼ    | 25000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 6,11                  |                             |
|   |         |        | メソトレキセート | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1                     | ①                           |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 HR (7-21日)<br>ΔA) 強化療法 HR2       |         |        |          | 4500 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1                     | ②                           |
|   |         |        | ※ロイコボリン  | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 3                     | 15mg/m <sup>2</sup> × 計3回ずつ |
|   |         |        | フィルデシン   | 3 mg/m <sup>2</sup>    | 静注   | 1,6                   |                             |
|   |         |        | イホマイド    | 800 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 2-4                   | 1回量                         |
|   |         |        | ※ウロミテキサン | 160 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 2,3                   | 1回量                         |
|   |         |        | ダウノマイシン  | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 5                     |                             |
|   |         |        | ロイナーゼ    | 25000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 6,11                  |                             |
|   |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,6                   |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 HR (7-21日)<br>ΔA) 強化療法 HR1       |         |        | メソトレキセート | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1                     | ①                           |
|   |         |        |          | 4500 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1                     | ②                           |
|   |         |        | ※ロイコボリン  | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 10,24,38,52           | 15mg/m <sup>2</sup> × 計3回ずつ |
|   |         |        | エンドキサン   | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 2-4                   | 1回量、計5回                     |
|   |         |        | キロサイド    | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 5                     | 1回量                         |
|   |         |        | ロイナーゼ    | 25000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 6,11                  |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 HR (7-35日)<br>ΔA) 再寛解導入療法 III+L  |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8                   | 最大2.0mg/body                |
|   |         |        | テラルピシン   | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,8                   |                             |
|   |         |        | ロイナーゼ    | 10000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 1,4,8,11,15,18,22,25  |                             |
|   |         |        | エンドキサン   | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 15                    |                             |
|   |         |        | キロサイド    | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 17-20,24-27           |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 HR (7-42日)<br>ΔB) 強化療法 I B+VL    |         |        | エンドキサン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1,29                  |                             |
|   |         |        | キロサイド    | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 3-6,10-13,17-20,24-27 |                             |
|   |         |        | ロイナーゼ    | 5000 U/m <sup>2</sup>  | 筋注   | 3,6,10,13,17,20,24,27 |                             |
|   |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 15,22                 |                             |
|   |         |        | エンドキサン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1,29                  |                             |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 HR (7-70日)<br>ΔB) 強化療法 M5+VL     |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 8,22,36,50            |                             |
|   |         |        | メソトレキセート | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 8,22,36,50            | ①                           |
|   |         |        |          | 4500 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 8,22,36,50            | ②                           |
|   |         |        | ※ロイコボリン  | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 10,24,38,52           | 15mg/m <sup>2</sup> × 計3回ずつ |
|   |         |        | ロイナーゼ    | 12500 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 10,24,38,52           |                             |
|   |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,8,15,22             | 最大2.0mg/body                |
| 【小児白血病】JPLSG ALL-B12 HR (7-35日)<br>ΔB) 再寛解導入療法 III+VL |         |        | テラルピシン   | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,8                   |                             |
|   |         |        | ロイナーゼ    | 10000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 1,4,8,11,15,18,22,25  |                             |
|   |         |        | エンドキサン   | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 15                    |                             |
|   |         |        | キロサイド    | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 17-20,24-27           |                             |
|   |         |        | エンドキサン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1,29                  |                             |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名   | 1コースの日数 | 予定コース数 | 使用抗がん薬       | 投与量                    | 投与方法 | 投与日                                  |
|---|---------|--------|--------------|------------------------|------|--------------------------------------|
| 【小児白血病】Low dose VP+CA                         | 7日      |        | エトポシド        | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1-7                                  |
|   |         |        | キロサイド        | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1-7                                  |
|   |         |        | エトポシド(体重)    | 1 mg/kg                | 中心静脈 | 1-7                                  |
|   |         |        | キロサイド(体重)    | 0.66 mg/kg             | 中心静脈 | 1-7                                  |
| 【小児白血病】AML-12 protocol 寛解導<br>入療法1A ECM       | 12日     |        | エトポシド        | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-5                                  |
|   |         |        | キロサイド        | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 6-12                                 |
|   |         |        | ノバントロン       | 5 mg/m <sup>2</sup>    | 中心静脈 | 6-10                                 |
| 【小児白血病】AML-12 protocol 寛解導<br>入療法2 HCEI       | 5日      |        | イダマイシン       | 10 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1                                    |
|   |         |        | キロサイド        | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1-3                                  |
|   |         |        | エトポシド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-5                                  |
| 【小児白血病】AML-12 protocol 強化療<br>法1 sECM         | 8日      |        | エトポシド        | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-3                                  |
|   |         |        | ノバントロン       | 5 mg/m <sup>2</sup>    | 中心静脈 | 4-6                                  |
|   |         |        | キロサイド        | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 4-8                                  |
| 【小児白血病】AML-12 protocol 強化療<br>法2 HCE          | 5日      |        | キロサイド        | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1-5                                  |
|   |         |        | エトポシド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-5                                  |
| 【小児白血病】AML-12 protocol 強化療<br>法3 HCl          | 3日      |        | イダマイシン       | 10 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1                                    |
|   |         |        | キロサイド        | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1-3                                  |
| 【小児白血病】AML-12 protocol 強化療<br>法4 HC           | 5日      |        | キロサイド        | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1-5                                  |
| 【小児白血病】AML-12 protocol 強化療<br>法1 HCM          | 5日      |        | ノバントロン       | 5 mg/m <sup>2</sup>    | 中心静脈 | 1-3                                  |
|   |         |        | キロサイド        | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1-5                                  |
| 【小児白血病】AML-12 protocol 強化療<br>法2 HCEI         | 5日      |        | イダマイシン       | 10 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1                                    |
|   |         |        | キロサイド        | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1-3                                  |
|   |         |        | エトポシド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 1-5                                  |
| 【小児白血病】AML-12 protocol 強化療<br>法3 HCM          | 5日      |        | ノバントロン       | 5 mg/m <sup>2</sup>    | 中心静脈 | 1-3                                  |
|   |         |        | キロサイド        | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1-5                                  |
| 【小児白血病】JPLSG ALL T-11(寛解導<br>入療法 I A) day8~35 | 28日     | 1コース   | オンコビン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注   | 1,8,15,22                            |
|   |         |        | ダウノマイシン      | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 1,8,15,22                            |
|   |         |        | ロイナーゼ        | 5000 U/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 5,8,11,14,17,20,23,26                |
|   |         |        | デカドロン(10歳未満) | 10 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-21                                 |
|   |         |        | デカドロン(10歳以上) | 10 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-7, 15-21                           |
|   |         |        | デカドロン(共通)    | mg/m <sup>2</sup>      | 経口   | 22-28 (5→2.5→1.25mg/m <sup>2</sup> ) |
|   |         |        | TIT(髄注)      | 0                      | 髄注   | 5,(11),(20),26                       |
|   |         |        | 最大2mg/body   |                        |      | 分3                                   |
| 【小児白血病】JPLSG ALL T-11(早期強<br>化療法 I B) day36~  | 42日     | 1コース   | エンドキサン       | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1,29                                 |
|   |         |        | キロサイド        | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 3-6,10-13,17-20,24-27                |
|   |         |        | ロイナーゼ        | 5000 U/m <sup>2</sup>  | 筋注   | 3.6.10.13.17.20.24.27.               |
|   |         |        | ロイケリン        | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-28                                 |
|   |         |        | TIT          |                        | 髄注   | 10,24                                |
|   |         |        | 分1寝る前        |                        |      |                                      |
| 【小児白血病】JPLSG ALL T-11(HR強化<br>療法)             | 7日      | 2コース   | アラノンジ        | 650 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5                                  |
| 【小児白血病】JPLSG ALL T-11(HR3)                    | 21日     | 1コース   | キロサイド        | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1,2                                  |
|   |         |        | エトポシド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 3-5                                  |
|   |         |        | ロイナーゼ        | 25000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 6,11                                 |
|   |         |        | TIT          |                        | 髄注   | 5                                    |
| 【小児白血病】JPLSG ALL T-11(HR2)                    | 21日     | 1コース   | デカドロン        | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 1-5                                  |
|   |         |        | フィルデシン       | 3 mg/m <sup>2</sup>    | 静注   | 1,6                                  |
|   |         |        | メソトレキセート     | 5000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈 | 1                                    |
|   |         |        | ※ロイコポリン      | 15 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 3                                    |
|   |         |        | イホマイド        | 800 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈 | 2-4                                  |
|   |         |        | ※ウロミテキサン     | 160 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 2-4                                  |
|   |         |        | ダウノマイシン      | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈 | 5                                    |
|   |         |        | ロイナーゼ        | 25000 U/m <sup>2</sup> | 筋注   | 6,11                                 |
|   |         |        | TIT          |                        | 髄注   | 1                                    |
|   |         |        | 最大5mg/body   |                        |      | 分3                                   |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注)臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名                          | 1コースの日数 | 予定コース数 | 使用抗がん薬   | 投与量                    | 投与方法  | 投与日      |                                |
|--------------------------------|---------|--------|----------|------------------------|-------|----------|--------------------------------|
| 【小児白血病】JPLSG ALL T-11(HR1)     | 21日     | 1コース   | デカドロン    | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-5      | 分3                             |
|                                |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注    | 1,6      | 最大2mg/body                     |
|                                |         |        | メソトレキセート | 5000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈  | 1        | 10%を30分で、残り90%を23.5時間で投与       |
|                                |         |        | エンドキサン   | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 2-4      | 1回量                            |
|                                |         |        | キロサイド    | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈  | 5        | 1回量                            |
|                                |         |        | ロイナーゼ    | 25000 U/m <sup>2</sup> | 筋注    | 6,11     | ソル・コーテフと併用                     |
| 【小児MDS】AZA                     | 28日     | 4~9コース | ビダーザ     | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1-5(or7) |                                |
| 【小児HL】HL-14 (OEPA男児)           | 28日     | 2コース   | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注    | 1,8,15   | 10kg未満の場合は0.05mg/kg、最大2mg/body |
|                                |         |        | エトポシド    | 125 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 2-6      |                                |
|                                |         |        | プレドニン    | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口/点滴 | 1-15     | 最大80mg、day16-22で漸減             |
|                                |         |        | ドキシソルビシン | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1,15     |                                |
| 【小児HL】HL-14 (COPDAC男児)         | 28日     | 2コース   | エンドキサン   | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,8      |                                |
|                                |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,8      | 10kg未満の場合は0.05mg/kg、最大2mg/body |
|                                |         |        | プレドニン    | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 経口/点滴 | 1-15     | 最大60mg、day16-22で漸減             |
|                                |         |        | ダカルバジン   | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1-3      |                                |
|                                |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注    | 1,8,15   | 10kg未満の場合は0.05mg/kg、最大2mg/body |
| 【小児HL】HL-14 (OPPA女児)           | 28日     | 2コース   | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注    | 1,8,15   | 10kg未満の場合は0.05mg/kg、最大2mg/body |
|                                |         |        | プレドニン    | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口/点滴 | 1-15     | 最大80mg、day16-22で漸減             |
|                                |         |        | ドキシソルビシン | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1,15     |                                |
|                                |         |        | プロカルバジン  | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 経口    | 1-15     | 分1~3                           |
|                                |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注    | 1,8      |                                |
| 【小児HL】HL-14 (GOPP女児)           | 28日     | 2コース   | エンドキサン   | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1,8      |                                |
|                                |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注    | 1,8      | 10kg未満の場合は0.05mg/kg、最大2mg/body |
|                                |         |        | プレドニン    | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 経口/点滴 | 1-15     | 最大60mg、day16-22で漸減             |
|                                |         |        | プロカルバジン  | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 経口    | 1-15     | 分1~3                           |
| 【小児悪性リンパ腫】CHOP                 | 21日     |        | プレドニン    | 50 mg/m <sup>2</sup>   | 経口    | 1-5      |                                |
|                                |         |        | ドキシソルビシン | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 1,2      |                                |
|                                |         |        | オンコビン    | 2 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴    | 1        | 最大2mg/body                     |
|                                |         |        | エンドキサン   | 750 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴    | 1        |                                |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG B-NHL03 コース1A  | 14日     |        | メソトレキセート | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈  | 1        |                                |
|                                |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注    | 2        |                                |
|                                |         |        | エンドキサン   | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 2-4      | 1回量                            |
|                                |         |        | テラルビシン   | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈  | 3,4      |                                |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG B-NHL03 コースP   | 10日     |        | オンコビン    | 1 mg/m <sup>2</sup>    | 静注    | 3        | 最大2.0mg/body                   |
|                                |         |        | エンドキサン   | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 4-6      |                                |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG B-NHL03 コース2A  | 14日     |        | メソトレキセート | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈  | 1        |                                |
|                                |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注    | 2        |                                |
|                                |         |        | エンドキサン   | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 2-4      | 1回量                            |
|                                |         |        | テラルビシン   | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈  | 3,4      |                                |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG B-NHL03 コース2B  | 5日      |        | メソトレキセート | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 1        |                                |
|                                |         |        | キロサイド    | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 1-4      |                                |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG B-NHL03 コース3A  | 14日     |        | メソトレキセート | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈  | 1        |                                |
|                                |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注    | 2        |                                |
|                                |         |        | エンドキサン   | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 2-4      | 1回量                            |
|                                |         |        | テラルビシン   | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈  | 3,4      |                                |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG B-NHL03 コース3B  | 5日      |        | メソトレキセート | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 1        |                                |
|                                |         |        | キロサイド    | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 1-5      |                                |
|                                |         |        | エトポシド    | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 3-5      |                                |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG B-NHL03 コース4A1 | 14日     |        | メソトレキセート | 5000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈  | 1        |                                |
|                                |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注    | 2        |                                |
|                                |         |        | エンドキサン   | 250 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 2-4      | 1回量                            |
|                                |         |        | テラルビシン   | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈  | 3,4      |                                |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG B-NHL03 コース4A2 | 14日     |        | メソトレキセート | 5000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈  | 1        |                                |
|                                |         |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注    | 2        |                                |
|                                |         |        | エンドキサン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈  | 4,5      |                                |
|                                |         |        | テラルビシン   | 30 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈  | 4,5      |                                |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG B-NHL03 コース4B  | 8日      |        | オンコビン    | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注    | 1        | 最大2.0mg/body                   |
|                                |         |        | キロサイド    | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈  | 2-4      | 1回量                            |
|                                |         |        | エトポシド    | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈  | 2-5      |                                |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示していません

| レジメン名                                      | 1コースの日数              | 予定コース数         | 使用抗がん薬           | 投与量                    | 投与方法     | 投与日                     |                        |
|--|----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG ALB-NHL03 寛解導入相 (week 2-5) | 28日                  | 1コース→早期強化相へ    | ブレドニン            | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口       | 1-21                    | 最大80mg (day22-28で漸減中止) |
|  |                      |                | オンコビン            | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注       | 1,8,15,22               | 最大2mg                  |
|  |                      |                | エンドキサン           | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴       | 1                       |                        |
|  |                      |                | ダウノマイシン          | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴       | 1,8,15                  | 最大60mg                 |
|  |                      |                | ロイナーゼ            | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 点滴       | 2,4,6,9,11,13,16,18,20  |                        |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG ALB-NHL03 早期強化相 (week 6-9) | 28日                  | 1コース→CNS予防相へ   | エンドキサン           | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴       | 1                       |                        |
|  |                      |                | キロサイド            | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴       | 1-4,8-11,15-18,22-25    |                        |
|  |                      |                | ロイケリン            | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口       | 1-28                    | 分1寝る前                  |
|  |                      |                | エンドキサン           | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴       | 15                      |                        |
|  |                      |                |                  |                        |          |                         |                        |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG ALB-NHL03 CNS予防相           | 35日                  | 1コース→再寛解導入相へ   | メソトレキセート         | 5000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴       | 1,15,29                 | MTX開始36時間目よりLV救助開始     |
|  |                      |                | ロイケリン            | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 経口       | 1-35                    | 分1寝る前                  |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG ALB-NHL03 再寛解導入相           | 28日                  | 1コース→後期強化相へ    | デキサメタゾン          | 10 mg/m <sup>2</sup>   | 経口 or 静注 | 1-14 (day15-21で漸減中止)    |                        |
|  |                      |                | オンコビン            | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注       | 1,8,15,22               | 最大2mg                  |
|  |                      |                | エンドキサン           | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴       | 1                       |                        |
|  |                      |                | ダウノマイシン          | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴       | 1,8,15                  | 最大60mg                 |
|  |                      |                | ロイナーゼ            | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 筋注       | 9,11,13,16,18,20        |                        |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG ALB-NHL03 後期強化相            | 21日                  | 1コース→早期維持相へ    | エンドキサン           | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴       | 1                       |                        |
|  |                      |                | キロサイド            | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴       | 1-4,8-11                |                        |
|  |                      |                | ロイケリン            | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口       | 1-14                    | 分1寝る前                  |
|  |                      |                |                  |                        |          |                         |                        |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG ALB-NHL03 早期維持相            | 77日                  | 2コース→休まず後期維持相へ | メソトレキセート         | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴       | 1                       |                        |
|  |                      |                | ブレドニン            | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口 or 静注 | 15-19,36-40,57-61       | 最大80mg                 |
|  |                      |                | オンコビン            | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注       | 15,36,57                | 最大2mg                  |
|  |                      |                | エンドキサン           | 500 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴       | 15,36                   |                        |
|  |                      |                | テラルピシン           | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴       | 57                      |                        |
|  |                      |                | ロイナーゼ            | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 筋注       | 2,15,22,36,43,57,64     |                        |
|  |                      |                | ロイケリン            | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口       | 15-77                   | 分1寝る前                  |
|  |                      |                |                  |                        |          |                         |                        |
| 【小児悪性リンパ腫】JPLSG ALB-NHL03 後期維持相            | 56日                  | 5コース→終了        | メソトレキセート         | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 静注       | 1,15,29                 |                        |
|  |                      |                | ロイケリン            | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 経口       | 1-56                    | 分1寝る前                  |
|  |                      |                | ブレドニン            | 40 mg/m <sup>2</sup>   | 経口 or 静注 | 43-47                   | 最大60mg                 |
|  |                      |                | オンコビン            | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静注       | 43,50                   | 最大2mg                  |
|  |                      |                | ロイナーゼ            | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 筋注       | 43,50                   |                        |
| 【小児白血病】BLIN                                | 日                    | 9コース           | ビーリンサイト(≧体重45kg) | 9 μg/body              | 点滴       | 1-7                     | 1コース目                  |
|  |                      |                |                  | 28 μg/body             | 点滴       | 8-28                    | 1コース目                  |
|  |                      |                |                  | 28 μg/body             | 点滴       | 1-28                    | 2コース目以降                |
|  |                      |                | ビーリンサイト(<体重45kg) | 5 μg/m <sup>2</sup>    | 点滴       | 1-7                     | 1コース目 (最大9μg/body)     |
|  |                      |                |                  | 15 μg/m <sup>2</sup>   | 点滴       | 8-28                    | 1コース目 (最大28μg/body)    |
|  | 15 μg/m <sup>2</sup> | 点滴             | 1-28             | 2コース目以降 (最大28μg/body)  |          |                         |                        |
| 【LBL】COG A5971 Induction                   | 35日                  | 1コース           | オンコビン            | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 中心静脈     | 1,8,15,22               | Max2mg/body            |
|  |                      |                | ダウノマイシン          | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈     | 1,8,15,22               |                        |
|  |                      |                | ロイナーゼ            | 6000 U/m <sup>2</sup>  | 筋注       | 4,6,8,11,13,15,18,20,22 | 月-水-金で計9回投与            |
| 【LBL】COG A5971 Consolidation               | 35日                  | 1コース           | エンドキサン           | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 中心静脈     | 1,15                    |                        |
|  |                      |                | キロサイド            | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 中心静脈     | 1-4,8-11,15-18,22-25    |                        |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません



| レジメン名                             | 1コースの日数 | 予定コース数              | 使用抗がん薬       | 投与量                    | 投与方法 | 投与日             |                               |
|-----------------------------------|---------|---------------------|--------------|------------------------|------|-----------------|-------------------------------|
| <b>小児他</b>                        |         |                     |              |                        |      |                 |                               |
| 【小児】CDDP                          | 14日     |                     | シスプラチン       | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-5             |                               |
| 【小児LCH】JLSG-02 Maintenance A      | 168日    | 1コース                | キロサイド        | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1               | week<br>7, 11, 15, 19, 23, 27 |
|                                   |         |                     | オンコピン        | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1               | week<br>7, 11, 15, 19, 23, 27 |
|                                   |         |                     | ブレドニン        | 2 mg/kg                | 経口   | 1-4             | week<br>7, 11, 15, 19, 23, 27 |
|                                   |         |                     | メソトレキセート     | 1 mg/kg                | 静注   | 1               | week<br>9, 13, 17, 21, 25, 29 |
|                                   |         |                     | ブレドニン        | 2 mg/kg                | 経口   | 1-3             | week<br>9, 13, 17, 21, 25, 29 |
| 【小児LCH】JLSG-02 Maintenance C      | 28日     |                     | エクザール        | 6 mg/m <sup>2</sup>    | 静注   | 1               |                               |
| 【小児脳胚細胞腫】ICE (IFM+CDDP+VP-16)     | 28日     | 3~6コース              | イホマイド        | 900 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5             |                               |
|                                   |         |                     | シスプラチン       | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-5             |                               |
|                                   |         |                     | エトポシド        | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-5             |                               |
| 【小児固形腫瘍】IREC                      | 14日     |                     | イリノテカン       | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-3             |                               |
|                                   |         |                     | エトポシド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-3             |                               |
|                                   |         |                     | カルボプラチン      | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1-3             |                               |
| 【小児LCH】JLSG-02 Special C          | 28日     | 9コース                | エクザール        | 6 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1               | 最大6mg/body                    |
|                                   |         |                     | ロイケリン        | 1.5 mg/kg              | 経口   | 1-28            | 分2朝夕                          |
|                                   |         |                     | メソトレキセート     | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | 15              |                               |
|                                   |         |                     | ブレドニン        | 2 mg/kg                | 経口   | 1-5             | 最大60mg/body                   |
|                                   |         |                     | エクザール(体重)    | 0.2 mg/kg              | 点滴   | 1               | 最大6mg/body                    |
|                                   |         |                     | ロイケリン(体重)    | 1.5 mg/kg              | 経口   | 1-28            | 分2朝夕                          |
|                                   |         |                     | メソトレキセート(体重) | 0.6 mg/kg              | 経口   | 15              |                               |
|                                   |         |                     | ブレドニン(体重)    | 2 mg/kg                | 経口   | 1-5             | 最大60mg/body                   |
| 【小児LCH】JPLSG LCH-12 寛解導入相 A       | 42日     |                     | オンコピン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,15,29         | 最大2.0mg/body                  |
|                                   |         |                     | キロサイド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5,15-19,29-33 |                               |
|                                   |         |                     | オンコピン(体重)    | 0.05 mg/kg             | 静注   | 1,15,29         | 最大2.0mg/body                  |
|                                   |         |                     | キロサイド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5,15-19,29-33 |                               |
| 【小児LCH】JPLSG LCH-12 早期維持相 A 治療区分a | 7日      |                     | オンコピン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1               | 最大2.0mg/body                  |
|                                   |         |                     | キロサイド        | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1               |                               |
|                                   |         |                     | オンコピン(体重)    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1               | 最大2.0mg/body                  |
|                                   |         |                     | キロサイド        | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1               |                               |
| 【小児LCH】JPLSG LCH-12 早期維持相 A 治療区分b | 7日      |                     | オンコピン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1               | 最大2.0mg/body                  |
|                                   |         |                     | メソトレキセート     | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1               |                               |
|                                   |         |                     | オンコピン(体重)    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1               | 最大2.0mg/body                  |
|                                   |         |                     | メソトレキセート     | 20 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1               |                               |
| 【小児LCH】JPLSG LCH-12 後期維持相 C 治療区分a | 7日      |                     | エクザール        | 6 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | 1               |                               |
|                                   |         |                     | エクザール(体重)    | 0.2 mg/kg              | 点滴   | 1               |                               |
| 【小児LCH】JPLSG LCH-12 寛解導入相 B       | 42日     |                     | オンコピン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1,15,29         | 最大2.0mg/body                  |
|                                   |         |                     | ドキソルビシン      | 35 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,15,29         |                               |
|                                   |         |                     | エンドキサン       | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5,15-19,29-33 |                               |
|                                   |         |                     | オンコピン(体重)    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1,15,29         | 最大2.0mg/body                  |
|                                   |         |                     | ドキソルビシン      | 35 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1,15,29         |                               |
|                                   |         |                     | エンドキサン       | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5,15-19,29-33 |                               |
| 【小児LCH】JPLSG LCH-12 早期維持相 B 治療区分a | 7日      |                     | オンコピン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1               | 最大2.0mg/body                  |
|                                   |         |                     | ドキソルビシン      | 35 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1               |                               |
|                                   |         |                     | オンコピン(体重)    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1               | 最大2.0mg/body                  |
|                                   |         |                     | ドキソルビシン      | 35 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1               |                               |
| 【小児LCH】JPLSG LCH-12 早期維持相 B 治療区分b | 7日      |                     | メソトレキセート     | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 1               |                               |
| 【小児LCH】JPLSG LCH-12 早期維持相 B 治療区分c | 42日     |                     | オンコピン        | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1               | 最大2.0mg/body                  |
|                                   |         |                     | エンドキサン       | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1               |                               |
|                                   |         |                     | オンコピン(体重)    | 0.05 mg/kg             | 点滴   | 1               | 最大2.0mg/body                  |
|                                   |         |                     | エンドキサン       | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1               |                               |
| 【小児胚細胞腫瘍】CARE (VP-16+CBDCA)       | 21日     | 3コース(IEと交互に計6コース)   | カルボプラチン      | 600 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1               |                               |
|                                   |         |                     | エトポシド        | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-3             |                               |
| 【小児胚細胞腫瘍】IE (VP-16+IFM)           | 21日     | 3コース(CAREと交互に計6コース) | エトポシド        | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 1-5             |                               |
|                                   |         |                     | イホマイド        | 1800 mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 1-5             |                               |
| <b>MSI-High</b>                   |         |                     |              |                        |      |                 |                               |
| 【MSI-High】Pembro                  | 日       | PDまで                | キイトルーダ       | 200 mg/body            | 点滴   | 1               | q3w                           |
|                                   |         |                     |              | 400 mg/body            | 点滴   | 1               | q6w                           |
| <b>TMB-High</b>                   |         |                     |              |                        |      |                 |                               |
| 【TMB-High】Pembro                  | 日       | PDまで                | キイトルーダ       | 200 mg/body            | 点滴   | 1               | 3週1コース                        |
|                                   |         |                     |              | 400 mg/body            | 点滴   | 1               | 6週1コース                        |

PD: Progressive Disease, AUC: カルバート式から算出する目標AUC, mg/m<sup>2</sup>: 体表面積あたりの量, mg/kg: 体重あたりの量  
注) 臨床試験、治験、患者限定採用レジメンは表示しておりません